
PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1910
September 1899
R. W. Gibson, Inv.

Florae Dresdenſis Nomenclator;

oder

ſyſtematiſches Verzeichniſs

der

in der Gegend von Dresden wildwachſenden Sexualpflanzen,

mit Angabe ihrer Standörter.

Frucht mehrjähriger botaniſcher Wanderungen

von

Chriſtian Traugott Bucher,
Churfürſtl. Sächſ. penſionirtem Chirurgus.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Dresden, 1806.

in der Waltherſchen Hofbuchhandlung.

+QK314
.B83

Vorerinnerung.

Die wegen ihrer vortrefflichen Lage und mannichfaltigen reizenden Aussichten von Einheimischen und Fremden so sehr gepriesene und besuchte Gegend von Dresden bietet in ihren anmuthigen Thälern, Gründen und versteckten Bergschluchten, einen so grosen Schatz botanischer Reichthümer dar, dass es in der That Wunder nimmt, noch keine gedruckte Beschreibung derselben zu besitzen. Von jeher stille Abgezogenheit liebend, ein Freund der Natur, und

durch die nahe Verwandſchaft des Pflanzen-Studiums mit meinem Metier, gleichſam von ſelbſt darauf geleitet, lernte ich bey meinen täglich in verſchiedenen Richtungen unternommenen Spatziergängen dieſe Schätze näher kennen, und mich mit ihnen unter Zuhülfenehmung andrer Floren, nach und nach vertraut machen. In der ganzen Gegend des Elbthals, fünf Stunden oberhalb und unterhalb der Reſidenz, wird ſchwerlich, weder im Thale ſelbſt, noch auf den zu beyden Seiten ſich hin ziehenden Gebirgen, irgend ein von Menſchen betretener Fuſsſteig ſeyn, den ich nicht ebenfalls begangen, und von deſſen grünem Gewande ich nicht mit botaniſch plündernder Hand mir etwas zugeeignet hätte. So wuchs nach und nach die mir eingetragene Beute zu einer ſo anſehnlichen Sammlung

an, dafs ich, dem es bis dahin auch nicht in der entfernteften Weife jemals in die Gedanken gekommen war, in dieſer Welt als Schriftſteller aufzutreten, gleichſam von ſelbſt, und um nicht die Frucht meiner vieljährigen botaniſchen Wanderungen durch einen unglücklichen Zufall bey Lebzeiten, oder nach meinem Tode, *(ne turbata volent rapidis ludibria ventis,)* vielleicht wieder zerſtäuben zu laſſen, auf den Entſchluſs fallen muſste, ſelbige durch öffentliche Bekanntmachung mehr gemeinnützig zu machen. Ich hatte, und habe dabey eine doppelte Abſicht. Einmal, den Freunden der Botanik, durch die Angabe der jedesmaligen Standörter einer Pflanze, das Auffinden derſelben nach dem Linneiſchen Sexualſyſtem, in hieſiger Gegend zu erleichtern, indem ich zugleich meine Leſer dadurch in den Stand ſetze, mich, ob ich hierbey richtig beobachtet habe, gleichſam zu kontro-

liren. Andern Theils glaubte ich aber auch, den hiesigen Herren Aerzten und Apothekern, denen zeither der Pflanzen-Reichthum hiesiger Gegend nicht vollständig bekannt war, hierdurch eine Gelegenheit an die Hand zu geben, dafs sie sich manche officinelle Pflanze, die sie vorher vom Droguisten erkaufen mufsten, oder von ihren eignen auf Kräutersammlung ausgeschickten, theils unkundigen, theils unbemühten Leuten in der benöthigten Quantität und Qualität nicht erlangen konnten, nunmehro frisch, in Menge, und wegen der gewonnenen Zeitersparnifs im Aufsuchen, mit wenigern Kosten, auch in ächter, von dem *Dispensatorio* vorgeschriebenen Art, sich verschaffen können. So wird man z. B. nicht mehr nöthig haben, statt der so wirksamen *Valerianae offic.* worunter die mit den schmälern Blättern die beste ist, die weit minder wirksame *Val. Phu* — statt

des *Millefolii nobilis* (*Achilleae nob. L.*) das gewöhnliche *Millefolium*, welches jenem an balsamischen Kräften bey weitem nachstehet, — statt des frischen Safts des *Nasturtii aquatici*, den der *Cardamines amarae*, — statt des *Conii maculat. L.* die *Aethusam Cynapium* und *Cicutam virosam* — statt der *Caricis arenariae L.* die ihr so täuschend ähnliche Wurzel der *Car. hirtae* und *distichae*, — statt der *Florum papav. rhoeados* die Blumenblätter des Garten-Mohns, der an Orten, wo jene nicht wild wachsen, sogar absichtlich zum medicinischen Behufe in Gärten erbaut wird, u. s. w. anzuwenden, wie doch zeither leider! an so vielen, absonderlich kleinen Orten, und da wo der Arzt selbst die Arzney zuzubereiten und auszutheilen pflegt, nicht selten der Fall ist.

Eben diese Rücksicht hat mich abgehalten, gegenwärtigem Namensverzeichnisse

von Pflanzen durch ausführliche Beyſetzung der einer jeden Gattung und Spezies in dem Linneiſchen Syſteme angewieſenen Charakteriſtik, theils ein gelehrtes Anſehen, theils auch eine Voluminoſität zu geben, die das Herumtragen deſſelben in der Taſche dem wandernden Kräuterforſcher nur erſchweren und dabey das Werk ſelbſt vertheuern würde. Auswärtige Pflanzenliebhaber können ja dieſe Charakteriſtik aus jedem andern botaniſchen Handbuche erſehen; mithin würde ſie hier ganz überflüſsig geweſen ſeyn, und ich dabey kein anderes Verdienſt, als das des Abſchreibens gehabt haben. Einheimiſche aber können ſich dieſen meinen Nomenclator mit weiſſem Papiere durchſchieſſen laſſen, und die fehlenden Charaktere nach Belieben entweder lateiniſch aus Willdenows neueſter Ausgabe der Linneiſchen *Species plantarum*, Hoffmanns bota-

nischem Taschenbuche u. d. g. oder deutsch mit den nöthigen Abkürzungen, aus DIETRICHS Pflanzenreich von LUDWIG, oder aus einem SCHKUR, HEIM u. s. w. selbst hinzusetzen, welches letztere besonders mit den in hiesiger Residenz sich dem medicinisch-chirurgischen Studium und der Apothekerkunst widmenden Subjekten, ingleichen mit denjenigen Gärtnern, welche die Botanik wissenschaftlich betreiben wollen, der Fall ist. Ueberhaupt geben die gewöhnlichen viel zu kurz abgefasten Taschenbücher nur selten hinlängliche Auskunft zur schulgerechten Bestimmung und Klassifikation einer Pflanze. Und da die unter freyem Himmel, in dem Anatomirsaale der Natur angestellten Untersuchungen und Vergleichungen dieser Art sehr viele Zeit wegnehmen, bey ungünstiger Witterung aber sehr beschwerlich und oft ganz un-

möglich sind, so habe ich es immer am besten und bequemsten gefunden, die ausgehobene ganze Pflanze ins Löschpapier einzulegen, und solche auf der Stube bey vollester Musse und ungestört nach obigem klassischen Werke Willdenows und den angeführten deutschen Autoren zu bestimmen.

Es kommt mir übrigens nicht zu, über Werth oder Unwerth vorliegenden Büchleins ein Urtheil fällen zu wollen; aber doch schmeichle ich mir, dass man meinem Fleise und meiner Aufmerksamkeit Gerechtigkeit wiederfahren lassen wird, da die Anzahl der von mir eingetragenen Sexualisten an zusammen 941, (mit Inbegriff der etlichen bey Willdenow als blosse Abarten vorkommenden Spezies,) in der That nicht gering ist, indem sie die Barbyer Flora

von SCHOLLERN (Leipzig, 1775) um nicht weniger denn 123 Nummern übertrifft, und der von dem Herrn Grafen von MATTUSCHKA herausgegebenen, sich über eine ganze grose Provinz verbreitenden *Enumeratio Stirpium in Silesia sponte crescentium*, (Breslau, 1779) nur um 20 Nummern der Sexualisten nach steht.

Bedeutung der im Buche vorkommenden Zeichen.

♄ Baum oder Strauch,

♃ perennirend,

♂ zweyjährig,

☉ jährig,

☿ Zwitterblume,

♀ weibliche Blume.

Classis I.

Monandria, *Einmännige.*

Digynia, *Zweywcibige.*

Callitriche.

1. C. verna, *Frühlingswasserstern.* In ⊙ Mai, Juny. kleinen Bächen und in stehenden Gewässern allenthalben.

2. C. intermedia, *Mittler Wasserstern.* ⊙ Mai-- July. Mit vorigem hin und wieder.

3. C. autumnalis, *Herbstwasserstern.* Mit ⊙ August, Septbr. vorigen gemein.

Classis II.
Diandria, *Zweymännige.*
Monogynia, *Einweibige.*

Ligustrum.

4. L. vulgare, *Gemeiner Hartriegel,*
♄ Juny, July. *Rheinweide.* Im grofsen Garten; Plauenschen Grunde; auf der Remise und sonst an Hecken und Zäunen.

Syringa.

5. S. vulgaris, *Türkischer Hollunder,*
♄ Mai. *Huck auf die Magd.* An Gärten; an Hecken; im grofsen Garten.

Circaea.

6. C. lutetiana, *Gemeines Hexenkraut,*
♃ July, August. *Waldkletten.* Im Plauenschen Grunde in Schluchten. Vor Costebaude, im Leuteritzer Gehölze in kleinen Schluchten. In Oberposte; bey Niedervogelgesang. Im Ottowalder Grunde, u. s. w.

7. C. intermedia, *Mittles Hexenkraut.*
24 July, August. Beym Eingange ins Pillnitzer Friedrichsthal. An der Röder und beym Ligauer Bade. Im Plauenschen Grunde im feuchten Gebüsche. Vor Niederwartha in den buschichten Schluchten, und sonst hin und wieder.

8. C. alpina, *Alpen-Hexenkraut.* Bey
24 July, August. Hohnstein am Berge über der Stadtmühle; Weg von Hohnstein nach Schandau im Grunde. Im Schandauer Grunde.

Veronica.

9. V. officinalis, *Apotheker- gemeiner Ehrenpreis.* In Waldungen ge-
Offic. Veronicae hb.
24 Juny, July. mein.

10. V. Serpyllifolia, *Quendelblättriger*
24 Juny, July. *Ehrenpreis.* Auf Wiesen und Aeckern nicht selten.

11. V. Beccabunga, *Bachbungen.* In den
Offic. Beccabungae hb. Bächen von Cotta, Eisenberg,
24 Juny, July. Volkersdorf, Bernsdorf u. s. w. An Quellen.

12. V. Anagallis, *Waſſer-Ehrenpreis.*
⊙ Juny, July. In und um Cotta und Lübtau in kleinen Bächen häufig.

13. V. ſcutellata, *Schildförmiger Ehrenpreis.*
♃ July, Auguſt. Am Birkwitzer See. Bey Moritzburg an Teichen und im Geſümpfe und an feuchten Orten nicht ſelten.

14. V. Teucrium, *Wieſen-Ehrenpreis.*
♃ Juny, July. Im Plauenſchen Grunde auf Anhöhen. Im Zſchonen- und Conſtappler Thale an gleichen Orten.

15. V. Chamaedrys, *Gamanderartiger Ehrenpreis.*
♃ May, Juny. Auf Wieſen; im Laubholze und an Bächen gemein.

16. V. proſtrata, *Geſtreckter Ehrenpreis.*
♃ May, Juny. Auf Ebwieſen; im groſsen Gehege und ſonſt auf trocknen Hügeln.

17. V. agreſtis, *Acker-Ehrenpreis.* Im
⊙ May-- July. Graſe nicht ſelten.

18. V. arvenſis, *Feld-Ehrenpreis.* Auf
⊙ May-- July. Aeckern gemein.

19. V. hederaefolia, *Epheublättriger*
⊙ April, May. *Ehrenpreis.* Blühet mit vorigem allenthalben.

20. V. triphyllos, *Dreyblättriger Ehrenpreis.* Auf Aeckern in Geſellſchaft mit vorigen.
⊙ April, May.

21. V. verna, *Frühlings-Ehrenpreis.* Auf
⊙ April-- Juny. Sandäckern und Brachen. Im Radebeiler Gehölze u. ſ. w.

Gratiola.

22. G. officinalis, *Officinelles Gnadenkraut, wilder Aurin.* An der
Offic. Gratiolae hb. Elbe gemein.
24 Juny-- Auguſt.

Pinguicula.

23. P. vulgaris, *Gemeines Fettkraut.* Vor
24 May. Langebrück auf der Wieſe zwiſchen dem Liegauer und Langenbrücker Wege, ohnweit der Scorzonera humilis, an einem Feldwege; ſparſam.

Utricularia.

24. U. vulgaris, *Gemeiner Waſſer-*
24 July, Auguſt, *ſchlauch.* Im groſsen Gehege. Hinter dem Heller im Erlenbruche. Beym Storche, am Fuſsſteige von Pirna nach Lohmen bey der ſteinigten Anhöhe in einer kleinen Lache. Auf den Ottendorfer Sumpfwieſen in kleinen Waſſergräben häufig, und ſonſt hin und wieder.

Verbena.

25. V. officinalis, *Eiſenkraut, Eiſerich.*
Offic. Verbenae hba. ☉ July--Septbr. In Dörfern gemein.

Lycopus.

26. L. europaeus, *Europäiſcher Wolfs-*
24 July--Septbr, *fuſs.* An Bächen und Teichen.

Salvia.

27. S. Sylveſtris, *Wilde Salbey.* Zwi-
24 July. ſchen dem Garniſon-Lazarethe und Holzhofe am Graben zur rechten Hand. Vor dem Dorfe Mücken an einer Lache. Unter dem Prieſsnitzer Pavillon am Felſen; ſehr ſparſam.

28. S. pratenſis, *Wieſen-Salbey.* Blühet
24 May, Juny. allenthalben.

29. S. verticillata, *Wirtelförmige Salbey.* Bey Zſchaſchendorf, wenn
♂ July, Auguſt. man von Sörnewitz kommt zur rechten Hand hinter einer niedrigen Mauer. Vor Coſſebauda ungefähr ½ Stunde auf einem Acker bey der buſchigten Anhöhe. In Dohna auf der Burg. Bey Gieſshübel an Feldrändern. An der Elbe zuweilen. Unter Gröbern auf hoch liegenden Aeckern an den Weinbergsmauern; ſparſam.

Digynia, *Zweyweibige.*

Anthoxanthum.

30. A. odoratum, *Ruchgras.* Auf Wie-
24 April.. July. ſen und Weiden, auch im Gebüſche; gemein.

Classis III.

Triandria, *Dreymännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Valeriana.

31. V. dioica, *Kleiner Sumpfbaldrian.*

24 May, Juny, Auf Sumpfwiesen über dem Heller, bey Rähnis, Wilschdorf; auf dem Borsberge u. s. w.

32. V. officinalis, *Officineller Baldrian.*

Offic. Valerianae minoris s. sylvestris radix. An der Weiseritz, Röder und Wesenitz. Im Hoflösnitzgrunde am Bache, und sonst im feuchten Gebüsche.

24 Juny-- August.

Var. V. officinalis foliis angustioribus. Eingang in den Plauenschen Grund auf der buschigten Anhöhe dem Hegereuter gerade über. Auf der Tharandter Ruine. Im Liebethaler Grund am Wasser. An der Müglitz zwischen Dohna und Wesenstein. Auf dem Groscottaer Berge. Hinter Weinböhla; bey Gröbern, Nieder- und Oberau im Gesträuche und an Weinbergen.

33. V. olitoria, *Lämmerlattich, Rapunzeln.* Auf Aeckern unter der Saat häufig.
⊙ April-- Juny.

34. V. dentata, *Gezahnter Lämmerlattich.* Hat mit vorigem gleichen Standort.
⊙ July, August.

Polycnemum.

35. P. arvense, *Knorpelkraut.* Auf den sandigen Aeckern bey Wilschdorf, Kraupe, Jessen, Brockwitz u. s. w.
⊙ July, August.

Gladiolus.

36. G. communis, *Gemeine Siegwurz, Allermannsharnisch.* Weg von Stadt Wehlen nach Dorf Rathewalde über dem steinernen Tische auf der hohen Buschwiese. Auf den Nassen nach Meissen zu, aber sparsam.
Offic. Victorialis rotundae rad.
♃ July, August.

Iris.

37. I. pseud-Acorus, *Wasser-Schwerdlilie.* Bey Moritzburg an Teichen und im Gesümpfe und sonst an mehrern Orten gemein.
Offic. Acori paluſtris rad.
♃ Juny, July.

38. I. Sibirica. *Sibirische Schwerdlilie.*
24 May, Juny. Auf den Niederauer Wiesen und auf der Nasse zwischen Gröbern und Niederau. Im Kreyschaer Thale vor der Hummelmühle zur linken Hand auf einer mit Erlen umgebenen Wiese; auch vor der Brandmühle auf einer grosen Wiese.

Schoenus.

39. S. albus, *Weisses Knopfgras.* Auf
24 July, August. Sumpfwiesen zwischen Schulwitz und Eschdorf. Vor Langebrück am Buschrande zur linken Hand bey den kleinen Teichen. An den Seifersdorfer Teichen vor Lomnitz. Auf den Ottendorfer Sumpfwiesen und an mehrern Orten; häufig.

40. S. compressus, (Scirpus Caricis) *Riedgrasartiges Knopfgras.* Hinter
24 May, Juny. Constappel im Prinzengrunde am Bache häufig. Auf den Nassen zwischen Zscheyla und Gröbern,

Cyperus.

41. C. flavescens, *Gelblichtes Cypergras.*

⊙ July—Septbr. Auf den naſſen Wieſen zwiſchen Wachau und Lomnitz. An Moritzburger Teichen. Vor Lomnitz unter den Seyfersdorfer Teichen auf magern Viehtriften häufig. Hinter Volkersdorf am niedern und obern Waldteiche mit Car. cyperoides an der Mitternachtſeite. Am Johann-Georgen- und Jägerteiche.

42. C. fuſcus, *Schwarzbraunes Cypergras.*

⊙ July—Septbr. Bey der Pillnitzer Ziegelſcheune. Auf dem Serkwitzer Elbheger. An Moritzburger Teichen; ſparſam.

Scirpus.

43. S. paluſtris, *Sumpfbinſengras.* An 24 May, Juny. feuchten Gräben gemein.

44. S. Baeothryon, *Torfbinſe.* Auf den 24 Juny, July, Sumpfwieſen zwiſchen Wahnsdorf und Reichenberg. Zwiſchen Dippelsdorf und Reichenberg. Bey Moritzburg. Auf den Naſſen nach Gröbern zu.

45. S. ovatus, (capitatus) *Köpfiges Binſengras.* Vor Radebeil auf Sumpfwieſen; ſparſam. An Teichen vor Lauſa zur rechten Hand, vorzüglich auf der ausgeworfenen Schlammerde mit Carex cyperoides, und in den abgelaſſenen Teichen ſelbſt. Im abgelaſſenen Groſsteiche bey Zſchorna am Bache. Hinter Volkersdorf an den Waldteichen.

♃ Juny-- Auguſt.

46. S. acicularis, *Nadelförmiges Binſengras.* Auf den Sumpfwieſen von Wahnsdorf, Reichenberg, Radebeil. Auf dem Serkwitzer Elbheger und an Moritzburger Teichen; gemein.

♃ Juny-- Auguſt.

47. S. lacuſtris, *Teichbinſen.* Im Egelſee vor Pirna. Im Mockeritzer Teiche. In Moritzburger Teichen u. ſ. w.

♃ Juny, July.

48. S. Setaceus, *Borſtenartiges Binſengras.* Am Birkwitzer See. Sumpfwieſen bey Dürre Biehla, Rähnis, Moritzburg. Am Bache über der Mordgrundbrücke in der Heyde. Am Ufer der Teiche, und ſonſt gemein.
24 Juny—Auguſt.

49. S. maritimus, *Ufer-Binſengras.* Am Elbufer im groſsen Gehege und im Waſſergraben wo man nach Uibigau über die Elbe fährt. Bey Brockwitz an der Elbe. Am ſchwarzen Bäre. Bey Zſchorna am Groſsteiche ſehr häufig.
24 Juny, July,

50. S. Sylvaticus, *Waldbinſengras.* An Moritzburger Teichen und ſonſt an Bächen und auf naſſen Wieſen; gemein.
24 Juny, July,

Eriophorum.

51. E. vaginatum, *Scheidiges Dünngras.* Auf den Sumpfwieſen bey Weiſsig und hinter dem Fiſchhauſe; ſparſam. Bey Gottleube auf dem wüſten Schloſſe. Um Altenberg in feuchten Waldungen ſehr häufig.
24 Juny, July.

52. E. polyſtachion, *Vielähriges Dünngras, Alte Mägde.* Auf Sumpfwieſen; gemein.
24 May— July.

Nardus.

53. N. ſtricta, *Borſtengras.* Auf den naſſen Wieſen von Gönnsdorf, Wilſchdorf und dem Heller. Am Prieſsnitzbache und ſonſt gemein.
24 May, Juny.

Digynia, *Zweyweibige.*

Alopecurus.

54. A. pratenſis, *Wieſenfuchsſchwanz.* Gemein.
24 May, Juny.

55. A. geniculatus, *Knieförmiger Fuchsſchwanz.* An feuchten Gräben.
24 May, Juny.

Phalaris.

56. P. arundinacea, *Rohrartiges Glanzgras.* Im Groſsengarten Teiche. Am Elbufer und ſonſt gemein.
24 Juny, July.

57. P. phleoides, *Raupengras, Liſchartiges Glanzgras.* Im Moritzburger Thiergarten. Auf den Loſchwitzer Anhöhen. Auf der Boſel bey Sörnewitz.
⊙ Juny, July,

58. P. oryzoides, (Leersia oryzoides)
24 August-- Septbr. *Reisartiges Glanzgras.* In Brockwitz hinter dem Pfarrgarten im Teiche. An der Lockwitz in Brockwitz, und in Friedewalde an eben diesem Bache.

Panicum.

59. P. verticillatum, *Quirlförmiges*
⊙ Juny-- Septbr. *Hirsegras.* Vorzüglich im Gartenlande.

60. P, glaucum, *Graues Hirsegras, Fönnich.*
⊙ July. August. Auf Aeckern bey Neudorf, Pieschen und Mücken.

61. P. viride, *Grünes Hirsegras.* Mit vo-
⊙ Juny-- August, rigem in Gesellschaft. In Weinbergen.

62. P. Crusgalli, *Hahnenfüfsiges Hirse-*
⊙ July, August. *gras.*

Var. a, aristis longissimis. An Gräben und feuchten Orten.

b, aristis brevioribus. Im trocknen Sandboden sehr häufig mit seinen Gefährten.

63. P. miliaceum, *Gemeiner Hierſe.* Im
⊙ July, Aug. Kraut- und Erdbirnenlande hin und wieder.

64. P. Sanguinale, *Bluthierſe.* An Mauern;
⊙ July—Septbr. auf Sandäckern und in Weinbergen.

Phleum.

65. P. pratenſe, *Wieſen-Liſchgras*, *Timotheusgras.* Auf Wieſen und
24 Juny—Septbr. Ackerrändern.

66. P. nodoſum, *Knotiges Liſchgras.*
24 Juny—Aug. Mit vorigem; vorzüglich auf Aeckern bey Pirna, Zehiſt und mehrern Orten.

Milium.

67. M. effuſum, *Waldhierſegras.* Im
24 Juny, July. Plauenſchen- Niederboyeritzer- und Nieder-Warthaer Gründe an Bächen und ſchattigten Gebüſchen.

Agroſtis.

68. A. Spica venti, *Acker-Strauſsgras*,
⊙ Juny, July. *Windhalm.* Im Korn- und Haferlande.

69 A. arundinacea, *Rohrartiger Windhalm.* Im Plauenſchen Grunde und am Prieſsnitzbache auf Anhöhen. Im Schlottewitzer Thale auf Anhöhen ſehr häufig.
♃ Juny, July.

70. A. canina, *Hunde-Windhalm.* Auf feuchten Wieſen gemein.
♃ Juny, July.

71. A. capillaris, (A. hiſpida) *Feinriſpiger Windhalm.* Auf trocknen Weiden und Feldrainen gemein.
♃ Juny, July.

Dactylis.

72. D. glomerata, *Knaulgras.* Auf Wieſen und in Grasgärten gemein.
♃ May—July.

Aira.

73. A. aquatica, *Waſſerſchmelen, Militzgras, Quellgras.* An der Weiſeritz und im Erlenbruche hinter dem Heller; ſparſam. In dem Stadtgraben von Hayn häufig.
♃ Juny, July.

74. A. ceſpitoſa, *Raſenſchmelen, Glanzſchmelen.* An Bächen und in feuchten Waldungen.
♃ Juny, July.

75. A. flexuosa, *Buschschmelen, Drat-*
24 Juny, July. *schmelen.* In der Dresdner Heyde; gemein.

76. A. canescens, *Graue Schmelen.* Auf
24 July, August. dem Sande hinter dem neuen Anbau. Auf dem Sandhügel bey dem Pillnitzer Fährhäuschen. Im Gebüsche vor Radebeul u. s. w.

77. A. praecox, *Frühe Schmelen.* Am
⊙ May, Juny, Priesnitzbache und in der Dresdner Heide mit A. caryophyllea.

78. A. caryophyllea, *Nelkenartige Schmelen.*
⊙ May, Juny. Im Hoflösnitzgrunde am Bache. In der Dresdner Heyde hin und wieder. Auf sandigen Brachen.

Melica.

79. M. ciliata, *Gefranztes Perlgras.* Hin-
24 Juny, July, ter dem Hegereuter über Plauen auf der Anhöhe an einer niedrigen Mauer, und sonst im Grunde auf Anhöhen; aber sparsam.

80. M. nutans, *Uiberhängendes Perlgras.*
24 May, Juny, In schattigten Hainen gemein.

81. M. coerulea, (Aira coerulea) *Blaues Perlgras.* Auf feuchten Wiesen und in Waldungen. Bey Cotta am obern Teiche.
♃ Aug. Septbr.

Briza.

82. B. media, *Mittleres Zittergras.* Auf Wiesen und Ackerrändern hin und wieder.
♃ May, Juny.

Poa.

83. P. aquatica, *Wasser-Rispengras.* An Bächen und in stehenden Gewässern gemein.
♃ Juny, July.

84. P. trivialis, *Dreyblüthiges Rispengras.* Auf Wiesen gemein.
♃ May, Juny.

85. P. angustifolia, *Schmalblättriges Rispengras.* In Gesellschaft mit vorigem, vorzüglich an schattigten Orten.
♃ May, Juny.

86. P. pratensis, *Wiesen-Rispengras.* Auf Wiesen.
♃ May, Juny.

87. P. paluſtris, *Sumpf-Riſpengras.* An
24 Juny--Auguſt. Waſſergräben und in den Feſtungswerken vor dem Dohnaer Schlage. Am Prieſsnitzbache und ſonſt nicht ſelten.

88. P. annua, *Jähriges Riſpengras.* Auf
⊙ April--Septbr. Grasplätzen gemein.

89. P. nemoralis, *Hainen-Riſpengras.*
24 Juny, July. Auf den Remiſen unter Lindengebüſche. Im Zſchoner- und Conſtappler Thale auf buſchigten Anhöhen.

90. P. criſtata, *Kammförmiges Riſpen-*
24 Juny, July. *gras.* Vorm ſchwarzen Thore an der Elbe und auf den äuſſern Feſtungswerken. Bey Antons an der Elbe u. ſ. w.

91. P. compreſſa, *Flachhalmiges Riſpen-*
24 Juny, July. *gras.* An Weinbergsmauern unter Loſchwitz, und auf andern Mauern nicht ſelten.

92. P. bulboſa, *Knolliges Riſpengras.*
24 May, Juny. Blühet im groſsen Gehege unter den Linden und ſonſt allenthalben.

Cynosurus.

93. C. cristatus, *Kammgras.* Auf Wiesen
24 May-- July. hin und wieder.

Festuca.

94. F. ovina, *Schaf-Schwingel.* Im Plauen-
24 May-- July. schen Grunde auf Anhöhen gemein.

95. F. rubra, *Rother Schwingel.* Blühet
24 May, June. mit vorigem auch auf Wiesen an der Weiseritz und andern Orten.

96. F. duriuscula, *Harter Schwingel.*
24 May, July. Uiber der Plauenschen Brücke auf felsigten Anhöhen.

97. F. elatior, *Hoher Schwingel.* Auf
24 June-- August. Elbwiesen.

98. F. myurus, *Mäuseschwanzartiger*
⊙ June-- August. *Schwingel.* Am rechten Ufer der Weiseritz über der Ostrabrükke; sparsam.

99. F. decumbens, *Gestreckter Schwin-*
24 July, August. *gel.* Im Grase vorzüglich auf niedrigen Buschwiesen.

100. F. fluitans, *Manna - Schwingel, Schwaden.* In ſtehenden Gewäſſern; an Bächen und auf wäſsrigen Wieſen gemein.
♃ May-- July.

Bromus.

101. B. ſecalinus, *Roggen-Treſpe.* In der Saat, vorzüglich im Kornlande.
☉ May-- Auguſt.

102. B. mollis, *Weicher Treſpe.* *) An Wegen und Zäunen gemein.
☉ May, Juny.

103. B. inermis, *Queck-Treſpe.* Auf Elbwieſen vor Neudorf, Mücken u. ſ. w.
♃ Juny, July.

104. B. ſterilis, *Tauber-Treſpe.* An Hekken und Zäunen.
☉ Juny, July.

105. B. tectorum, *Dach-Treſpe.* Im Plauenſchen Grunde an Felſen und auf Mauern und Dächern allenthalben.
♂ May, Juny.

106. B. giganteus, *Futter-Treſpe, Wald-Treſpe.* An Bächen in ſchattigtem Gebüſche gemein.
♃ July-- Septbr.

*) (Var.) B. nanus, digitalis. Auf den Cottaer Wieſen im Graſe und anderwärts.

107. B. pinnatus, *Gefiederte Treſpe.* Im
24 June, July. Plauenſchen Grunde auf Anhöhen nicht ſelten. Vor Gröbern im Geſträuche ſehr häufig und an mehrern Orten.

Avena.

108. A. elatior, *Hoher Hafer.* Auf Elbwieſen häufig.
24 May-- July.

109. A. fatua, *Taubhafer.* Im Haferlande.
⊙ June-- Auguſt.

110. A. pubeſcens, *Zarthaariger Hafer.*
24 May-- July. Auf Wieſen gemein.

111. A. flaveſcens, *Goldhafer, Gelblicher Hafer.* Auf Wieſen allenthalben.
24 June, July.

112. A. ſtrigoſa, *Grauer Hafer, Eichelhafer.* Unter dem gemeinen Hafer nicht ſelten.
⊙ June, July.

Arundo.

113. A. phragmites, *Teichrohr, Schilf.* Am Elbufer und in Teichen und Sümpfen gemein.
24 July, Auguſt.

114. A. Calamagroſtis, *Wieſenſchilf*, 24 Juny, July. *Rohrgras.* *) An den Moritzburger Teichen und auf der Viehleite bey Pirna, mit Arundo phragmites. Vor Dorf Wehlen im ſumpfigen Gebüſche und an andern Orten.

115. A. arenaria, *Sandrohr*, *Sandſchilf*. 24 Juny, July. Auf dem Sandhügel vor dem neuen Michaeliſchen Weinberge mit Elymus arenarius. Vor dem Mordgrunde an einer Elbweiche. Kleine Sandſchlucht vor der Preſſe bey Wachwitz.**)

Lolium.

116. L. perenne, *Ausdauernder Lolch*. 24 Juny--Auguſt. Auf Grasplätzen allenthalben.

117. L. temulentum, *Taumellolch*. In ⊙ Juny--Auguſt. der Saat, vorzüglich im Gerſtenlande.

*) Die Halme ſind nur bisweilen, nicht immer äſtig. Im letztern Falle iſt ſie die A. canescens. -- WIGG.

**) A. colorata WILLD. iſt mit Phalaris arundinacea einerley.

Elymus.

118. E. arenarius, *Sandhafer*, *Sandhaargras*. Bey dem Pillnitzer Fährhäuschen. Bey dem wilden Manne. Auf dem Sandhügel über dem Linkischen Bade und an mehrern sandigen Orten.
♃ Juny, July.

119. E. caninus, *Queckenartiges Haargras*, *Hunds-Haargras*. An der Weiseritz bey Potschappel häufig.
♃ Juny, July,

Hordeum.

120. H. murinum, *Mäusegerste*, *Taubgerste*. An Mauern, in Gesellschaft mit Polygonum aviculare und malva rotundifolia; gemein.
⊙ Juny, July.

Triticum.

121. T. repens, *Quecken*, *Hundsgras*. Auf Aeckern und in Weinbergen; gemein.
Offic. Graminis rad.
♃ Juny--Auguſt.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Montia.

122. M. fontana, *Quell-Montie.* Im Plauenschen Grunde hinter der Brücke an einer Quelle. Im Erlenbruche vor Langebrück am Liegauer Wege. Hinter dem ersten Weissiger Berge, in einer kleinen nassen Schlucht nahe an der Strasse u. s. w.

⊙ May--July.

Holosteum.

123. H. umbellatum, *Blumengras, Akkernelkengras, Spurre.* Auf Aeckern und an Wegen gemein.

⊙ April, May.

Classis IV.

Tetrandria, *Viermännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Dipsacus.

124 D. sylvestris, *Weberdistel, Weberkarten.* In Prieſsnitz, Coſtebaude und im Plauenſchen Grunde, gemein.
♂ July, August.

125. D. pilosus, *Haarige Kartendiſtel.* Bey Prieſsnitz ungefähr 500—600 Schritte unterm Waſſerpalais auf der buſchigten Anhöhe zur linken Hand.
♂ July, August.

Scabiosa.

126. S. succisa, *Teufels-Abbiſs.* Auf Wieſen und im Laubholze gemein.
Offic. Morsus Diaboli rad. hb.
24 August, Septbr.

127. S. integrifolia, *Ganzblättrige Scabioſe.* Auf Feldrändern zwiſchen Cotta und Leutewitz; ſehr ſelten.
⊙ July, August.

128. S. fylvatica, *Wald-Scabioſe.* In
24 July, Auguſt. Oberpoſte an der Elbe auf der buſchigten Anhöhe. Im Klein-Sedlitzer Laubholze an der engen und feuchten Schlucht. Vor Nieder-Wartha im Laubholze; ſparſam.

129. S. arvenſis, *Acker-Scabioſe, Apoſtemkraut.* Auf Aeckern und Wieſen.
Offic. Scabiosae hb. flor.
24 Juny-- Auguſt.

130. S. columbaria, *Tauben-Scabioſe.*
24 Juny-- Septbr. Im Plauenſchen Grunde jenſeits der Weiſeritz im Gebüſche. Auf den Naſſen.

131. S. ochroleuca, *Gelbe Scabioſe.* Am
♂ July-- Septbr. Elbufer. Auf trocknen Anhöhen und Feldrändern. In Weinbergen.

Centunculus.

132. C. minimus, *Centunkel.* Bey den
☉ Juny-- Auguſt. Brockwitzer Windmühlen und vor dem Kalkofen auf Stoppeläckern. Auf den Anhöhen hinter Weiſsig nach der Aerndte.

Plantago.

133. P. major, *Groſser Wegerich, Wegebreite.* Auf Wieſen und an Wegen. Im Gartenlande.
Offic. Plantaginis latifoliae rad. hb.
♃ Juny—Auguſt.

134. P. media, *Mittler Wegerich.* Auf Wieſen und ſonſt gemein.
♃ May, Juny.

135. P. lanceolata, *Spitziger Wegerich.* Auf Wieſen und Anhöhen allenthalben.
Offic. Plantaginis minoris hb.
♃ May—Auguſt.

136. P. Pſyllium, (P. arenaria Willdenow,) *Flohſaamen-Wegerich, Pſyllienkraut.* Auf dem neuen Anbau. Bey den Strieſsnitzer Windmühlen. Bey Blaſewitz am Gehölze und auf Sandbrachen.
Offic. Pſyllii Semen.
⊙ July, Auguſt.

Sanguisorba.

137. S. officinalis, *Wieſenknopf, rothe Biberuell.* Auf Elbwieſen; auf Wieſen bey Cotta, Lübtau, Plauen und Potſchappel.
Offic Pimpinellae Italicae rad
♃ July, Auguſt.

Galium.

138. G. paluſtre, *Sumpflabkraut.* In Sümpfen und in ſtehenden Gewäſſern gemein.
♃ Juny--Auguſt.

139. G. uliginoſum, *Moraſtlabkraut.* An Gräben und auf naſſen Wieſen allenthalben.
♃ Juny, July.

140. G. harcynicum, *Harziſches Labkraut.* Bey Bärenſtein, Geiſing und Altenberg in Waldungen.
♃ July, Auguſt.

141. G. ſylveſtre, (G. Bocconi) *Wildlabkraut, Bocconiſches Labkraut.* Im groſsen Garten und Plauenſchen Grunde. Auf dem Lugaer Berge gegen Mittag.
♃ May--July.

142. G. verum, *Wahres Labkraut, Wegſtroh.* Auf Wieſen. An Hecken und Zäunen. In den äuſſern Feſtungswerken und ſonſt gemein.
Offic. Galii lutei hb.
♃ Juny, July.

143. G. Mollugo, *Weiſſes Labkraut.* Blühet mit vorigem in Geſellſchaft allenthalben.
♃ Juny, July,

144. G Sylvaticum, *Waldlabkraut.* Im
24 Juny-- Auguſt. Plauenſchen- Zſchoner- Coſtebauder- und Conſtappler-Grunde im Laubholze.

145. G. glaucum, *Graugrünes Labkraut.*
24 Juny, July. Im Plauenſchen Grunde zur rechten Hand an Felſen. Bey Weſenſtein an Felſen.

146. G. Aparine, *Klebkraut.* An Zäunen
⊙ Juny-- Auguſt. und Hecken gemein.

147. G. boreale, *Wieſenröthe.* Auf den
24 July, Auguſt. Niederauer Wieſen und ſogenannten Naſſen.

148. G. rotundifolium, *Rundblätteriges*
24 Juny-- Auguſt. *Labkraut.* Auf den buſchigten Anhöhen vor der Loſchwitzer Preſſe ohnweit einer ſteinernen Grotte. Hinter Weiſsig auf waldigten Anhöhen nahe an der Straſse mit Pyrola minor et ſecunda. Am Wilſchberge gegen Norden.

Asperula.

149. A. odorata, *Wohlriechender Waldmeister.* Auf dem Windberge. Im Seyfersdorfer- Maxner- Nieder Warthaer- und Reinhardsgrimmschen Grunde im schattigten Gebüsche. Auf dem Lugaer Berge. Auf dem Borsberge unter der Schäferey in einer buschigten Vertiefung und an mehrern Orten.

Offic. Matrisylvae s. Hepaticae stellatae hb. ♃ May-- July.

150. A. Cynanchica, *Halskräutlein, kleine Färberröthe.* An der Weiseritz bey der Schäferey. An der Elbe über dem Linkischen Bade zur linken Hand auf den sandigen Anhöhen. Auf der Bosel bey Sörnewitz u. s. w.

♃ June-- August.

Sherardia.

151. S. arvensis, *Kleine Ackerröthe, Acker-Sherardie.* Im Gersten- Hafer- und Krautlande gemein.

⊙ July, August.

Trapa.

152. T. natans, *Waſſernuſs, Stachelnuſs.*
Offic. Nuces aquaticae, ſ. Tribuli aquatici.
⊙ Juny, July.
In den Moritzburger Teichen häufig. Zwiſchen Uibigau und Kaditz in einer Lache am Wege. In dem obern und niedern Waldteiche, und im Johann-Georgen-Teiche.

Cornus.

153. C. Sanguinea, *Wilder Cornelbaum, rother Hartriegel.*
♄ Juny, July.
Im groſsen Garten. Im Plauenſchen- und Conſtappler Grunde. An Hecken und Zäunen hin und wieder.

Alchemilla.

154. A. vulgaris, *Gemeiner Sinau, Löwenfuſs.*
Offic. Alchemillae rad. hba.
♃ May, Juny.
Auf Wieſen und an Bächen gemein.

155. A. Aphanes, *Ackerſinau, Ackerloewenfuſs.*
⊙ May—July.
Auf Aeckern hin und wieder.

Digynia, *Zweyweibige.*

Cuscuta.

156. C. europaea, *Europaeiſche Seide, Flachsſeide.* Am Elbufer; bey Potſchappel, und bey Zaukeroda am Geſträuche. Auf Leinäckern bey Schönborn, Langenbrück, Reizendorf, Schönfeld u. ſ. w.

Offic. Cuscatae hb.

☉ July, Auguſt.

157. C. Epithymum, *Thymſeide, kleine Seide.* Im Graſe hin und wieder an der Euphorbia cyparissias, Rhinanthus criſta galli u. ſ. w. Auf der Boſel häufig.

Offic. Epithymi Cretici hb.

☉ July, Auguſt.

Tetragynia, *Vierweibige.*

Potamogeton.

158. P. natans, *Schwimmendes Saamkraut.* In ſtehenden Gewäſſern allenthalben.

24 Juny, July.

159. P. lucens, *Leuchtendes Saamkraut.* Im Mockeritzer Mühlteiche. Im kleinen Bache vor Volkersdorf. In Seifersdorfer Teichen vor Lomnitz. Im Egelſee. Hinter Zſaſchendorf im Waſſergraben.

24 Juny, July.

160. P. crispum, *Krauses Saamkraut.* In
24 May, Juny. Bächen und in stehenden Gewässern. Im Weiseritz Mühlgraben.

161. P. ferratum, *Wellenförmiges Saamkraut.* Im Egelsee vor Pirna.
24 Juny, July.

162. P. heterophyllum, *Verschiedenblättriges Saamkraut.* Mit vorigem in Gesellschaft, vorzüglich gegen die Mittagsseite.
24 August, Septbr.

163. P. compressum, *Flachstengliches Saamkraut.* Im kleinen Gehege. Im grosen Gehege in der Lache beym Pichplatze. Im Bache zwischen Wachau und Lomnitz häufig.
⊙ July, August.

Sagina.

164. S. procumbens, *Gestrecktes Mastkraut.* Auf Aeckern bey Rähnis, Wilschdorf u. s. w. Am Priesnitz- und Mordgrund-Bache. An den sandigen Ufern der Teiche, und sonst gemein.
⊙ Juny-- Septbr.

165. S. apetala, *Blütheloſes Maſtkraut.*

⊙ Mai-- Auguſt, Am Elbwege nach Loſchwitz an Weinbergsmauern mit vorigem; ſparſam.

Classis V.

Pentandria, *Fünfmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Echium.

166. E. vulgare, *Gemeiner Natterkopf.*
Offic. Echii s. Viperinae flores.
♂ Juny. July.
Blühet auf Brachen, Ackerrändern und an Wegen allenthalben.

Pulmonaria.

167. P. officinalis, *Lungenkraut.* Im Plauenschen Grunde im schattigten Gebüsche; gemein.
Offic. Pulmonariae maculosae hb.
♃ April-- Juny.

Cerinthe.

168. C. minor, *Kleine Wachsblume.* Am Windberge, unweit dem Kalkofen. Bey den Friedrichstädter Remisen auf Ackerrändern vor dem Pulvermagazine; sparsam.
♂ Juny, July.

Thesium.

169 T. linophyllum, *Leinblättriges Thesium.* Auf der Bosel bey Sörnewitz; sehr sparsam.
♃ Juny, July.

170. T. alpinum, *Alpen-Theſium.* Auf den Anhöhen hinter den Wachwitzer Weinbergen. Auf der ſonnigten Anhöhe bey Radebeul. Auf den Weiſsiger Anhöhen und ſonſt hin und wieder.

⊙ Juny, July.

Phyſalis.

171. P. alkekengi, *Judenkirſche.* Bey Kötzſchenbroda hinter der Kirche. Auf der Boſel bey Sörnewitz; ſparſam. In Weinbergen und Gärten.

Offic. Alkekengi baccae.

♃ Juny, July.

Lithospermum.

172. L. officinale, *Steinhierſe, Perlkraut.* Vor Gröbern im Geſträuche hin und wieder. Bey Dohna im Gebüſche und bey Unkersdorf, aber ſparſam.

Offic. Lithospermi ſ. Milii Solis ſemina.

♃ May-- July.

173. L. arvenſe, *Acker-Steinhierſe, Schminkwurzel.* Auf Aeckern gemein.

⊙ May-- July.

Symphytum.

374. S. officinale, *Beinwell, Schwarzwurz.* Auf Wiesen und an Bächen und Gräben gemein.

Offic. Consolidae majoris radix.

♃ Juny-- August.

375. S. tuberosum, *Knolliger Beinwell.* Im Plauenschen- und Zschonengrunde. Im Gebüsche unter Priesnitz, Costebauda, Niederwartha, Wildberg u. s. w.

♃ April-- Juny.

Borago.

376. B. officinalis, *Boretsch, Barragen.* Auf altem Gemäuer zuweilen. Im Gartenlande.

Offic. Boraginis hb. flor.

☉ Juny-- August.

Lycopsis.

377. L. arvensis, *Liebäugel.* Auf Aeckern gemein.

☉ Juny.

Cynoglossum.

378. C. officinale, *Hundszunge.* Am Costebaudaer Bache und im Grunde. In Weinböhla und dortigen Weinbergsgassen häufig, und sonst hin und wieder.

Offic. Cynoglossae rad. hb.

♂ Juny, July.

Anchusa.

179. A. officinalis, *Ochsenzunge.* Vor dem schwarzen und weissen Thore auf den äussern Festungswerken und sonst gemein.
Offic. Buglossi rad. hb. flor.
♃ Juny, July.

180. A. angustifolia, *Schmalblättrige Ochsenzunge.* Blühet mit vorigem in Gesellschaft.
♃ Juny, July.

Myosotis.

181. M. arvensis, *Ackermäuseohr, Vergissmeinnicht.* Auf Aeckern gemein.
⊙ May, Juny.

182. M. palustris, (M. Scorpicides,) *Sumpf-Mäuseohr.* An Bächen und auf nassen Wiesen; gemein.
♃ May, Juny.

183. M. Lappula, *Kletten-Mäuseohr, kleine Hundszunge.* In Cotta, Costebauda, auf der Festung Sonnenstein, und in Dohna auf Mauern zuweilen; aber sehr sparsam.
⊙ Juny. July.

Anagallis.

184. A. phoenicea, (A. arvensis,) *Acker-Gauchheil, rother Meyer.* Auf fruchtbaren Aeckern gemein.
Offic. Anagallidis hb.
⊙ July, August.

Lyſimachia.

185. L. vulgaris, *Gelber Weiderich, Ly-*
Offic. Lyſimachiae hb. flor.
24 Juny-- Auguſt.
ſimachie. An Flüſſen, Teichen und im ſchattigten Gebüſche.

186. L. thyrſiflora, *Sträuſsige Lyſima-*
24 Juny, July.
chie. Am Birkwitzer See. In Brockwitz am Pfarrgarten in einem kleinen Teiche. An den Moritzburger, Medinger und Zſchornaer Teichen.

187. L. nemorum, *Hain-Lyſimachie.* Im
24 Juny, July.
Plauenſchen Grunde über Hainsbach im feuchten Erlenbuſche am Wege. Bey Pillnitz im Friedrichsthale und andern feuchten Schluchten. Im Grunde der Moritzburger Chauſſee-Einnahme gerade über am Bache; ſparſam.

188. L. Nummularia, *Rundblättrige Ly-*
Offic. Nummulariae hb.
24 Juny, July.
ſimachie. Auf feuchten Wieſen und an Gräben gemein.

Primula.

189. P. officinalis, (P. veris,) *Himmelschlüssel, Schlüsselblume.* Im Plauenschen und Zschonengrunde. Bey Cotta und in den benachbarten Gegenden auf Wiesen allenthalben.

Offic. Primulae veris f. Paralyseos rad. hb. flor.

24 April, May.

190. P. inodora, (P. elatior,) *Hohe Schlüsselblume.* Blühet mit vorigem gemein.

24 April, May.

Hottonia.

191. H. palustris, *Sumpf-Hottonie.* In der Lache über dem Heller. Im Seyfersdorfer Thale beym Eremit. Zwischen Langenbrück und Lausa in kleinen Lachen häufig. Bey Berbisdorf. In Moritzburg am Wege zur Fasanerie vor der Brücke auf der Wiese zur linken Hand in einem kleinen Graben häufig; u. s. w.

24 May, Juny.

Menyanthes.

192. M. trifoliata, *Fieberklee, Bitterklee.* Auf Sumpfwiesen über dem Heller, bey Rähnis, Volkersdorf, Bernsdorf, Medingen; bey Zschorna und so weiter; gemein.

Offic. Trifolii fibrini f. aquatici hb.

24 May, Juny,

Androsace.

193. A. Septentrionalis, *Nördliches*
⊙ May, Juny. *Mannsschild.* Am Wege nach Blasewitz zur linken Hand auf einem Brachfelde hinter Hopfgartens; häufig.

Convolvulus.

194. C. arvensis, *Acker-Winde.* Auf Aek-
♃ Juny—August. kern gemein.

195. C. Sepium, *Zaun-Winde.* An Hecken
♃ Juny—August. und Zäunen gemein.

Datura.

196. D. Stramonium, *Stechapfel.* Bey
Offic. Daturae semina et Stramonii hb. Pillnitz auf dem Wirthschaftshofe und an den Ställen. In Priesnitz, Costebaude, Niederwartha und den benachbarten Dörfern hin und wieder.
⊙ July, August.

Hyoscíamus.

197. H. niger, *Schwarzes Bilsenkraut.*
Offic. Hyosciami hb. Semina. Blühet mit vorigem an gleichen Orten; aber sparsam.
♂ July, August.

Verbascum.

198. V. Thapsus, *Königskerze, Woll-*
Offic. Verbasci flor. hb.
☿ July-- Septbr. *kraut.* Im Plauenschen, Hermsdorfer und Seyfersdorfer Grunde auf Anhöhen. An der Pillnitzer Ruine. Bey Oberboiritz, Jessen, Bonnewitz u. s. w.

199. V. Lychnitis, *Lychnisartige Kerze.*
♃ July-- Septbr. Im Plauenschen Grunde.

200. V. nigrum, *Schwarze Kerze.* Bey
Offic. Verbasci nigri rad.
♃ July-- Septbr. Potschappel und sonst gemein.

201. V. Blattaria, *Schaben- oder Motten-*
☿ July, August. *kraut.* An der Elbe nach Loschwitz. Zwischen Neudorf und Pieschen. Zwischen Sörnewitz und Spaar an der Strasse zur linken Hand. In Cölln u. s. w. aber sparsam.

Vinca.

202. V. minor, *Singrün, Immergrün.*

Offic. Vincae pervincae hb.

♄ May, Juny.

Bey der Ockerwitzer Mühle. Am Eingange in den Ottowalder Grund. Bey Liebethal auf der Anhöhe zum Wirthshause hinauf. Im Seyfersdorfer Thale. Unter Nieder-Wartha ungefähr 200 Schritte auf der buschigten Anhöhe links, und sonst nicht selten.

Solanum.

203. S. Dulcamara, *Bitterfüss, Hirschkraut.*

Offic. Dulcamarae Stipites,

♄ Juny, July.

An der Elbe im Gesträuche und sonst an Bächen, Teichen und im Gebüsche. Am Mordgrundbache häufig.

204. S. nigrum, *Schwarzer Nachtschatten.*

Offic. Solani hb.

☉ July, August.

In Dörfern und im Gartenlande von Neudorf, Pieschen, Mücken u. s. w. gemein.

Atropa.

205. A. belladonna, *Belladonna, Toll-*
Offic. Bella-donnae rad. folia, baccae. *kraut, Waldnachtſchatten, Wolfskirſche.* Im Ottowalder
♃ July, August. Grunde, ſelten. In Rathewalder, Hohnſteiner und Radeberger Waldungen. In der Dresdner Heide. Auf dem Wilſchberge gegen Mittag, und im Rheinhardsgrimmſchen Thale auf hohen Waldungen zur rechten Hand.

Phyteuma.

206. P. Spicata, *Aehrentragende Rapunzel.* Im Plauenſchen Grunde in
♃ Juny. Schluchten und im Gebüſche. Am Windberge u. ſ. w.

207. P. nigra, *Schwarze Rapunzel.* Auf
♃ Juny. Wieſen bey Berggieſshübel und Gottleube.

Campanula.

208. C. rotundifolia, *Milch-Glocken.* Auf
♃ Juny, July, Wieſen, Ackerrändern und ſonſt gemein.

209. C. patula, *Weitblumige Glocken.*

♂ Juny-- Auguſt. Auf fruchtbaren Wieſen und Weiden.

210. C. perſicifolia, *Wald-Glocken, hohe*

♃ Juny, July. *Waldrapunzel.* Im Plauenſchen Grunde zur linken Hand bey der Buſch- Königs- und Neumühle und ſonſt im Gebüſche.

211. C. latifolia, *Breitblättrige Glocken.*

♃ July, Auguſt. Bey Berggieſshübel über dem Vitriolwerke und am Kirchberge. Im Fiſchhausgrunde; ſehr ſelten.

212. C. rapunculoides, *Rapunzelartige*

♃ Juny, July. *Glocken.* Im Laubholze gemein.

213. C. Trachelium, *Gemeine Glocken.*

♃ Juny, July. In Geſellſchaft mit vorigem allenthalben.

214. C. Cervicaria, *Natterkopfblättrige*

♂ Juny, July. *Glocken.* Im Zſchonen-Grunde auf den buſchigten Anhöhen zur linken Hand. Im Conſtappler Thale auf den buſchigten Anhöhen über Hartha häufig. Im Gebüſche zwiſchen Unkersdorf und Coſtebaude.

215. C. glomerata, *Büschel-Glocken.* Auf
24 Juny, July. der Bosel. Bey Gröbern im Gebüsche und sonst mit vorigem in Gesellschaft.

Lonicera.

216. L. Periclymenum, *Deutsche Lonicere, Geissblatt.* Im Plauenschen Grunde auf der Anhöhe hinter dem Hegereuter an der Mespilus germanica. Hinter Radeburg bey Zschorna hinter dem herrschaftlichen Grasgarten auf Teichdämmen und im sumpfigten Gebüsche beym Mühlteiche sehr häufig.
♄ Juny, July.

217. L. Xylosteum, *Heckkirsche.* Im grosen Gärten und im Plauenschen Grunde hin und wieder.
♄ May, Juny.

218. L. nigra, *Schwarze Heckkirsche.* Zwischen Dorf Bärenstein und Altenberg am Wege zur rechten Hand.
♄ May-- July.

Rhamnus.

219 R. catharticus. *Kreuzdorn, Purgier-dorn.* Im grofsen Garten und im Plauenschen Grunde auf Anhöhen hin und wieder; bey Koschütz an Hecken; auf der grofsen Remise. Vor Kreyscha am Fufssteige die Anhöhe hinauf und anderwärts.

Offic. Spinae cervinae baccae.

♄ May, Juny.

220. R. Frangula, *Faulbaum, Schiefsbeere.* Im feuchten Gebüsche allenthalben.

Offic. Frangulae cortex.

♄ May, Juny.

Evonymus.

221. E. europaeus, *Pfaffenhütchen.* An Hecken und Zäunen.

♄ May, Juny,

Ribes.

222. R. rubrum, *Rothe Johannisbeere.* Mit vorigem in Gesellschaft.

Offic. Ribium rubrorum baccae.

♄ April, May.

223. R. alpinum, *Wilde-Alpen-Johannisbeere.* Im Plauenschen Grunde hinter der Neumühle jenseits der Weiseritz. Im Lohmener Grunde.

♄ May, Juny.

224. R. nigrum, *Schwarze Johannisbeere.*
Offic. Ribium nigrorum hb. baccae.
♄ May, Juny.
Im Coſtebauder Grunde am Wege mit Crataegus Oxyacantha; häufig bey Zſchorna am Mühlteiche mit Lonicera Periclymenum. Bey Volkersdorf am Damme des niedern Waldteiches auf der Wieſe zur rechten Hand.

225. R. Uva criſpa, *Stachelbeere.* An
♄ April, May.
Hecken, Zäunen und in Weinbergsgaſſen.

Hedera.

226. H. Helix, *Epheu.* Im Plauenſchen-
Offic. Hederae arboreae lignum, folia, reſina, baccae.
♄ Septbr. Octobr.
und Lohmener Grunde. Im Seyfersdorfer Thale und an ähnlichen Orten.

Illecebrum.

227. I. verticillatum, *Knorpelblümel,*
2l July, Auguſt.
Nagelkraut. Auf den Lomnitzer Aeckern zuweilen. Im abgelaſſenen Groſsteiche bey Zſchorna mit Littorella lacuſtris; vor Lauſa am abgelaſſenen Teiche mit Carex cyperoides und Potentilla Norwegica

Digynia, *Zweyweibige.*

Asclepias.

228. A. Vincetoxicum, *Schwalbenwurz.*

Offic. Vincetoxici s. Hirundinariae hb. rad.

Im Plauenschen Grunde und sonst gemein.

♃ Juny, July.

Gentiana.

229. G. Pneumonanthe, *Gemeiner Enzian.*

♃ August, Septbr. Auf den Moritzburger Wiesen; auf der Bernsdorfer Pfarrwiese; vor Grosröhrsdorf an der Röder; vor Langenbrück, wo Scorzonera humilis wächst. Auf Sumpfwiesen zwischen Seyfersdorf, Wachau und Lomnitz; hinter Volkersdorf am obern Waldteiche.

230. G. Centaurium, (Chironia Centaurium) *Tausendguldenkraut.* Bey Potschappel im Gebüsche zur rechten Hand. Bey dem Liegauer Bade und im Seyfersdorfer Thale; im Zschoner-Grunde; im Constappler Thale auf der Anhöhe rechts unter den Harthaer Weinbergen häufig mit After annuus; auf der Bosel; am Wilschberge gegen Mittag. Bey Naundorf, Nieder-Wartha, Jessen und an mehrern Orten.

Offic. Centaurii minoris summitates s. hb.

⊙ July, August.

231. Var. β, statura minori, caule ramosissimo, flore inaperto, (Chironia inaperta.) Bey den Remisen an Feldgräben; bey Cotta an Wiesen und Ackerrändern; bey dem Liegauer Bade; bey Uibigau auf Grashügeln; selten. Auf den kleinen an der Nasse gränzenden Aeckern unter Gröbern sehr häufig mit Antirrhinum Elatine und Lythrum hyssopifolia; auch zwischen Niederau und Gröbern auf Aekkern an den nassen Wiesen; auf den Niederauer Wiesen an dem Weinböhlaer Fussteige mit L. hyssopifolia.

⊙ July--Septbr.

232. G. Amarella, *Bitterer Enzian.* Unter und zwischen Geising und dem Geisingsberge auf einer mit Bruchsteinen umgrenzten hohen Wiese, häufig mit Lilium bulbiferum; am Geisingsberge auf Wiesen nach dem Bärensteiner Wege zu.

Offic. Gentianellae hb. ☉ July, August.

233. G. campestris; *Feldenzian.* Hinter Weisig auf dem Buschberge auf der freyen Trift; häufig.

☉ Aug. Septbr.

Chenopodium.

234. C. bonus Henricus, *Guter Heinrich, Dorf-Gänsefuss.* In Dörfern allenthalben.

Offic. Boni Henrici hb. ♃ June.

235. C. murale, *Mauer-Gänsefuss.* Vor dem schwarzen Thore am Gasthofe zur Tanne; am Stadtkrankenhause im Hofe; bey der Schmelzmühle an der Mauer. In Strehla und Lübtau; in Friedrichsstadt an der Weiseritz, unter dem Zimmerhofe u. s. w.

♃ July, August.

236. C. urbicum, *Stadtgänſefuſs.* In ⊙ July, Auguſt. Kötzſchembroda und Coſswig häufig; in Kaditz.

237. C. album, *Weiſser Gänſefuſs.* An ⊙ July, Auguſt. Hecken, Zäunen und auf altem Gemäuer. Im Gartenlande.

238. C. viride, *Grüner Gänſefuſs.* Mit ⊙ July, Auguſt. vorigen gemein.

239. C. rubrum, *Rother Gänſefuſs.* In ⊙ July, Auguſt. Bernsdorf, Radebeul und Kötzſchenbroda; ſparſam. In Volkersdorf an der Straſse und in Bauerhöfen; in Reichenberg.

240. C. hybridum, *Stechapfelblättriger* ⊙ July, Auguſt. *Gänſefuſs.* An Mauern und in Dörfern auf Schutthaufen gemein.

241. C. glaucum, *Grauer Gänsefuſs.* Am
⊙ July, August. Fahrwege nach Strehla auf dem freyen Platze vor dem groſsen Garten häufig, und ſonſt nicht ſelten.

242. C. vulvaria, *Stinkender Gänsefuſs.*
Offic. Vulvariae hb. An den Straſsen der Vorſtadt
⊙ July. August. und ſonſt gemein.

243. C. polyſpermum, *Vielſaamiger*
⊙ July. August. *Gänsefuſs.* In Friedrichsſtadt an der Mauer der Churfürſtlichen Menagerie. Im Gartenlande häufig.

Herniaria.

244. H. glabra, *Glattes Bruchkraut.* Auf
Offic. Herniariae hb. ſandigen Braachen, Angern u. ſ.
⊙ Juny, July. w. gemein.

245. H. hirſuta, *Haariges Bruchkraut.*
⊙ July. August. Hat gleichen Standort; aber ſparſam.

Salsola.

246. S. kali, *Salzkraut.* Auf dem neuen Anbau; vor der Alaunhütte auf Aeckern. An Garten-Zäunen nach dem Prieſsnitzbache hin; vor Pieſchen an den Weinbergsgärten; ſparſam.
☉ July. August.

Ulmus.

247. U. campeſtris, *Rüſter*, *Ulme.* Im kleinen und groſsen Gehege auf Elbwieſen u. ſ. w.
Offic. Ulmi cortex medius. ♄ April, May.

248. U. octandra, (U. effuſa,) *Achtfädige Rüſter.* Hat mit vorigem gleichen Standort. Am weiſſen Thore bey dem innern Wachthauſe; bey dem Linkſchen Bade an der Gartenmauer; im groſsen Garten.
♄ April, May.

Umbellatae, *Dolden.*

Eryngium.

249. E. campeſtre, *Mannstreu*, *Donnerdiſtel.* An Wegen; auf trocknen Hügeln gemein.
Offic. Eryngii rad. ♃ July, August.

Hydrocotyle.

250. H. vulgaris, *Gemeiner Waſſernabel.*

24 Juny, July. An den Moritzburger Teichen; an den Zſchornaer Teichen; auf den Ottendorfer Sumpfwieſen vorzüglich am Buſchrande rechter Hand; an dem obern Waldteiche gegen Mitternacht; am Johann Georgen-Teiche; am Hermsdorfer Teiche über dem Teichhauſe bey Lauſa. Auf den Lomnitzer Sumpfwieſen und an dortigen nach Seyfersdorf gehörigen Teichen und anderwärts.

Sanicula.

251. S. europaea, *Europäiſcher Sanikel.*

Offic. Sanicula hb. 24 Juny, July. Im Zſchoner-Grunde hinter der Mühle auf der buſchigten Anhöhe; an den buſchigten Anhöhen und Schluchten vor Coſtebaude. Bey Dohna im Laubholze und an Bächen mit Aſtrantia major. Im Ottowalder Grunde u. ſ. w.

Aſtrantia.

252. A. major, *Schwarzer Sanikel, Aſtrantie.* Blühet in Geſellſchaft mit vorigem ſehr häufig. Im Kaitzer Thale.
♃ July, Auguſt.

Heracleum.

253. H. Sphondylium, *Unächte Bärenklau.* Auf Wieſen an allen Orten.
♂ Juny, July.

Caucalis.

254. C. daucoides, *Mohrrübenartige Haftdolde.* Zwiſchen Lübtau und Cotta auf Aeckern, und ſonſt hin und wieder.
⊙ Juny. July.

Daucus.

255. D. Carota, *Wilde Möhre.* Auf Wieſen gemein.
Offic. Dauci ſylveſtris Semina,
♂ Juny. July,

Tordylium.

256. T. Anthriſcus, (Caucalis Anthriſcus,) *Bettlerläuſe, Wald-Haftdolde.* An Hekken und Zäunen.
♂ July. Auguſt.

Laſerpitium.

257. L. prutenicum, *Preuſſiſch-Laſerkraut.* Auf Anhöhen im Zſchoner Grunde; bey Unkersdorf und Coſtebaude im Gebüſche. Auf Wieſen bey Dühlen, Potſchappel, Schulwitz, Eſchdorf, Langenbrück, Schönborn u. ſ. w.

24 July, Auguſt.

Conium.

258. C. maculatum, *Gefleckter Schierling.* An der Elbe hin und wieder. Auf dem Serkewitzer Heger an der Elbſtrom Seite; auf der Elbinſel bey Söbrigen; in Moritzburg bey der Faſanerie an den Hainbuchenhecken und anderwärts.

Offic. Cicutae hb.

♂ July, Auguſt.

Athamanta.

259. A. Cervaria, *Schwarze Hirſchwurz.* Unter Sörnewitz am Steinbruche auf der Anhöhe mit Lactuca perennis. Bey Gröbern im Geſträuche mit Selinum carvifolia nnd Valeriana officinalis, und auf den Dämmen der Naſſe; auf den Naſſen nach Meiſſen und nach Gröbern hin, häufig.

24 July-- Septbr.

260. A. Oreoſelinum, *Bergpeterſilie.*

Offic. Oreoſelini hb. rad. ſemina.

Vielgut, Grundheil. Auf den Loſchwitzer und Wachwitzer Anhöhen; bey Oberboyritz und Jeſſen; auf den Röderwieſen bey Grünberg; zwiſchen Laubegaſt und Zſchachwitz an Buſchrändern. Auf der Boſel und an mehrern Orten gemein.

21 July. Auguſt.

Peucedanum.

261. P. Silaus, *Wieſen-Haarſtrang.* Auf den Niederauer Wieſen und den ſogenannten Naſſen ſehr häufig.

21 Juny-- Auguſt.

Sium.

262. S. latifolium, *Breitblättriger Merk.* Auf dem Serkewitzer Heger; bey Zſchieren am Bache. Hinter Brockwitz am Lockwitzbache und auf den Naſſen u. ſ. w. gemein.

21 July, Auguſt.

263. S. nodiflorum, *Knotenblütiger Merk.* Hinter Mockeritz im Geſümpfe bey dem Mühlteiche und auf den Naſſen in Gräben; häufig.

21 July, Auguſt.

264. S. anguſtifolium, *Schmalblättriger*
24 July, Auguſt. *Merk.* Blühet in Geſellſchaft mit vorigen zuweilen.

265. S. falcaria, *Sichelblättriger Merk.*
24 Juny, July. Auf Aeckern unter der Saat, vorzüglich häufig bey Hopfgartens und Stückgieſſers.

Oenanthe.

266. O. fiſtuloſa, *Röhrige Rebendolde.*
24 Juny--Auguſt. Auf den ſogenannten Naſſen in Gräben. Am Lockwitzbache zwiſchen Brockwitz und Sörnewitz.

Selinum.

267. S. Sylveſtre, *Wilde Silge.* Hinter
24 Juny--Auguſt. dem Heller im Erlenbruche und ſonſt auf Sumpfwieſen im Geſträuche.

268. S. paluſtre, *Oelsnitzwurzel, Sumpf-*
Offic. Tyſſelini ſ. Olsnitii radix. *Silge.* Mit vorigem an gleichen
24 Juny, July. Orten. Vor Groſsnaundorf wo Teucrium Scorodonia wächſt; bey Zſchorna am Mühlteiche und im ſumpfigen Gebüſche daſelbſt.

269. S. carvifolia, *Kümmelblättrige Silge.*

24 August, Septbr. Auf dem Windberge. An der Wesenitz mit Selinum paluſtre im feuchten Gebüſche; im Leutewitzer Laubholze; im Conſtappler Thale; auf den Weiſsiger Anhöhen; bey dem Egelſee auf der buſchigten Anhöhe u. ſ. w.

Angelica.

270. A. Sylveſtris, *Wilde Engelwurz.*

Offic. Angelicae ſylveſtris rad. 24 July, Auguſt. An der Elbe auf Wieſen. Im Friedrichsthale bey Pillnitz, und an Bächen gemein.

Aethuſa.

271. A. Meum, *Bärwurz.* Bey Somsdorf, Dippoldiswalde, Gottleuba, Lauenſtein und Geiſing auf Wieſen; gemein. Zwiſchen Reinhardsgrimme und Luga mit Orchis ſambucina und O. incarnata.

Offic. Meiradix. 24 Juny, July.

272. A. Cynapium, *Garten-Gleiſs, Kleiner Schierling.* Im Gartenlande bey Neudorf, Pieſchen, Mücken und anderwärts.

⊙ Juny. July.

Scandix.

273. S. Pecten, *Nadel-Kerbel.* Auf Aeckern unter der Saat bey Cotta, Leutewitz, Reik und Prohlis. Bey Zſchaſchendorf; bey Niederau und Gröbern.

⊙ May-- July.

274. S. Anthriſcus, *Eſels-Kerbel, Kletten-Kerbel.* Im Plauenſchen Grunde hinter des Hegereuters Wohnung am Felſen unten; bey Döltzſchen; in Koſtebauda und Nieder-Wartha; an der Kirchmauer in Brockwitz gegen Morgen.

⊙ May, Juny.

275. S. Cerefolium, *Garten-Kerbel.* Auf altem Gemäuer und an Garten- und Weinbergsmauern zuweilen.

Offic Chaerefolii hba. Sem.

⊙ May, Juny.

Chaerophyllum.

276. C. Sylveſtre, *Wilder Kälberkropf.*
Offic. Cicutariae hb. ♃ May, Juny. Auf Wieſen und an Zäunen und Gebüſchen gemein.

277. C. bulboſum, *Knolliger Kälberkropf.*
☌ Juny - Auguſt. Im Geſträuche am Elbufer hin und wieder. An Hecken und Zäunen; nicht häufig.

278. C. temulum, *Berauſchender Kälberkropf.* Mit vorigen beyden in Geſellſchaft und ſonſt gemein.
☌ May, Juny.

279. C. hirſutum, *Rauher Kälberkropf.*
♃ May - Auguſt. Im Zſchoner- Coſtebauder- und Nieder-Warthaer Grunde; im Kaitzer Thale und auf Gebirgswieſen an kleinen Bächen. Im Lockewitzer und Ottowalder Grunde.

280. C. aromaticum, *Gewürzhafter Kälberkropf.* Im Zſchoner Grunde. Bey Potſchappel; bey Wildberg und an andern Orten; gemein.
♃ May - Juny.

Phellandrium.

281. P. aquaticum, *Waſſer-Fenchel, Roſs-Fenchel.* Im groſsen Gehäge; auf dem Serkewitzer Heger; vor Loſchwitz am Elbwege und vor Tolkewitz im Geſümpfe. Bey Zſchorna in Teichen und anderwärts.

Offic. Foeniculi aquatici Sem.

♂ July, Auguſt.

Seſeli.

282. S. annuum, *Jähriger Seſel.* Bey Oberboyritz auf graſigen Anhöhen mit Athamanta Oreoſelinum und Pimpinella Saxifraga; auf der Boſel und zwiſchen Sörnewitz und Zaſchendorf am Wege linker Hand mit Selinum carvifolia; nicht häufig.

⊙ Auguſt, Septbr.

Cicuta.

283. C. viroſa, *Giftiger Schierling, Wüterich.* Am Birkwitzer See; bey Grünberg, Medingen und an der Röder hin und wieder; an den Zſchornaer Teichen häufig.

Offic. Cicutae aquaticae hb.

♃ July, Auguſt.

Carum.

284. C. carvi, *Kümmel,* Auf Elbwiesen gemein.
Offic. Carvi semina.
♂ May, Juny.

Pastinaca.

285. P. sativa, *Wilder Pastinak.* Auf Wiesen bey Cotta, Lübtau und an der Elbe.
Offic. Pastinacae rad. sem.
♂ July, August.

Imperatoria.

286. I. Ostruthium, *Meister-Wurz.* Im Sächsischen Zinnwalde auf Wiesen.
Offic. Imperatoriae rad.
♃ Juny, July.

Aegopodium.

287. A. podagraria, *Gierfch.* In Thälern am Gesträuche und an Hecken und Zäunen.
♃ May, Juny.

Pimpinella.

288. P. saxifraga, *Stein-Bibernell.* Auf Hügeln und Wiesen gemein.
Offic Pimpinellae albae rad.
♃ July--Septbr.

289. P. magna, *Groſse Bibernell.* Auf Wieſen an der Elbe und Weſenitz; bey Kötzſchenbroda hinter dem Dorfe und an mehrern Orten.

Offic. Pimpinellae nigrae rad.

♃ Juny—Auguſt.

290. P. diſſecta, *Schlitzblättrige Bibernell*; auf den Anhöhen hinter der Weinpreſſe und Wachwitz; ſelten.

♃ Juny, July.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Viburnum.

291. V. Opulus, *Schneeball.* Im Kaitzer- und Lohmner Grunde, und ſonſt im ſchattigen Gebüſche hin und wieder.

♄ May, Juny.

Sambucus.

292. S. nigra, *Schwarzer Hollunder.* Im Plauenſchen Grunde und an Hekken gemein.

Offic. Sambuci cortex interior, flores, baccae.

♄ May, Juny.

293. S. racemoſa, *Trauben-Hollunder.* Im Plauenſchen Grunde; bey Tharand; im Rathewalder Grunde über dem Amſelloche; bey dem Liegauer Bade und anderwärts.

♄ May, Juny.

Alsine.

294. A. media, *Vogel-Meyer.* Blühet al-
⊙ April--Septbr. lenthalben.

Corrigiola.

295. C. littoralis, *Uferlingenkraut, Sand-*
⊙ Juny--Auguſt. *Hirſchſprung.* Am Ufer der Weiſeritz im Gehäge, wo ſie ſich in den Elbſtrom ergieſst; bey Zſchorna im abgelaſſenen Groſsteiche; an den Moritzburger Teichen.

Tetragynia, *Vierweibige.*

Parnassia.

296. P. paluſtris; *Waſſer-Leberblume,*
Offic. Hepaticae albae flores. *Sumpf-Parnaſſe.* Auf naſſen
24 Auguſt, Septbr. Wieſen; gemein.

Pentagynia, *Fünfweibige.*

Linum.

297. L. uſitatiſſimum, *Lein, Flachs.*
Offic. Lini ſemina. Auf Aeckern unter der Saat und
⊙ Juny, July. ſonſt hin und wieder.

298. L. Radiola, *Kleinſter Lein.* An dem
⊙ Juny, July. geſchlängelten Fuſswege zur Pillnitzer Ruine hinauf; am Fuſſe des Keulenberges nach Oberlichtenau zu; hinter Rähnis, Wilſchdorf und Volkersdorf auf Stoppeläckern; an ſandigen Ufern der Teiche nicht ſelten.

299. L. catharticum, *Purgier-Lein.* Auf
Offic. Lini cathartici hb. Wieſen allenthalben.
⊙ Juny — Auguſt.

Droſera.

300. D. rotundifolia, *Rundblättriger*
Offic. Roris ſolis hb. *Sonnenthau.* Auf Sumpfwieſen bey Lauſa, Schönborn, Dürre-
⊙ July — Septbr. Biehla, Lomnitz und Ottendorf; an den Seyfersdorfer Teichen.

301. D. longifolia (intermedia) *Lang-*
⊙ July — Septbr. *blättriger Sonnenthau.* Mit vorigem gemein.

Statice.

302. S. Armeria, *Gras-Nelke.* Auf trock-
24 July--Septbr. nen Hügeln und Weiden allenthalben.

Polygynia, *Vielweibige.*

Myosurus.

303. M. minimus, *Mäuse-Schwänzel.* An
⊙ May, Juny. Ackerrändern; im Grase und auf Dorfmauern.

Classis VI.

Hexandria, *Sechsmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Berberis.

304. B. vulgaris, *Sauerach, Berbisbeere.*
Offic. Berberidis baccae.
ħ May, Juny. In den Loschwitzer Weinbergen; auf dem Borsberge über der Ruine mit Pinus Strobus; im Costebauder, und Seyfersdorfer Thale; am Ausgange der Nasse unter Gröbern im Gesträuche mit Liguſtrum vulgare, und anderwärts.

Leucojum.

305. L. vernum, *Frühlings-Knotenblume.*
24 April, May. Ueber der Neumühle jenseits der Weiseritz auf der Wiese zur Pulvermühle hin.

Galanthus.

306. G. nivalis, *Schneeglöckchen.* Bey der Buschmühle unter Sträuchern nicht häufig; in Grasgärten.

Narcissus.

307. N. poeticus, *Rothrandige Narcisse.*

24 May, Juny. Im grofsen Garten über dem Teiche am Wege auf Wiesen hinter den Buchenhecken, zu beyden Seiten.

Allium.

308. A. carinatum, *Berg - Getraide-Lauch.* Im Plauenschen Grunde an Felsen hin und wieder.

24 July, August.

309. A. vineale, *Weinlauch, Ackerlauch.*

24 Juny, July. Auf Wiesen im Grase; in Weinbergen und an Zäunen und Hecken.

310. A. oleraceum, *Gemüs - Lauch.* Im Zschoner - Grunde und anderwärts im Gebüsche, an Hecken und Zäunen u. s. w.

24 Juny, July.

311. A. angulosum, *Eckiges Lauch.* Bey dem Eingange in das Dorf Döhlen auf der Mauer zur rechten Hand; in Bürgk auf Mauern; im Plauenschen Grunde; auf den Loschwitzer Anhöhen und Weinbergen; auf der Bosel.

24 Juny--Septbr.

312. A. Schoenoprasum, *Schnitt-Lauch.*

24 Juny--Septbr. Im kleinen Gehäge und anderwärts auf Elbwiesen.

Convallaria.

313. C. majalis, *Maizauken*, *Maiblume.*

Offic. Lilii convallium flor. 24 May. Im Plauenschen- Kaitzer- und Seyfersdorfer Thale u. s. w.; auf der Bosel, und auf den Weisiger Anhöhen im Laubholze.

314. C. verticillata, *Wirtelblättrige Maiblume.*

24 May, Juny. Vor Langebrück am Wege nach dem Liegauer Bade zur linken Hand im Erlenbruche; auf der Wiese zwischen und hinter Eschdorf und Schulwitz im Gesträuche; hinter Cunersdorf am Wege nach Schönfeld zur rechten Hand im Gesträuche, sparsam. Am Geisingsberge häufig.

315. C. polygonatum, *Grosse Maiblume*, *Salomons Siegel*, *Weisswurz.*

Offic. Sigilli Salomonis rad. 24 May, Juny. Im Plauenschen Grunde unter Koschütz auf der buschigen Anhöhe; auf der Bosel und sonst gemein.

316. C. multiflora, *Vielblütige Maiblume.* In schattigen Waldungen gemein.
♃ May, Juny.

317. C. bifolia, *Zweyblättrige Maiblume.* Im Laubholze.
♃ May, Juny.

Anthericum.

318. A. ramosum, *Aestige Zaunblume.* Am Priesnitzbache an der sandigen Anhöhe zur linken Hand; im Mordgrunde; auf der Bosel bey Sörnewitz, und bey Pirna auf den Copitzer Bergen.
♃ July, August.

319. A. Liliago, *Gemeine Zaunblume, Sandlilie.* Im Plauenschen Grunde bey dem Eisenhammer auf der Anhöhe zur rechten Hand; auf der Bosel sehr häufig.
♃ May, Juny.

Ornithogalum.

320. O. luteum, *Gelbblütige Vogel-Milch.* Im Plauenschen Grunde in feuchten Schluchten und anderwärts nicht selten.
♃ April, May.

321. O. minimum, *Kleinſte Vogelmilch.*
24 April, May. Auf Aeckern und auf Elbwieſen allenthalben.

322. O. umbellatum, *Doldenblütige Vogelmilch.* In den äuſſern Feſtungswerken vor dem Dippoldiswalder Schlage und ſonſt gemein.
24 May, Juny.

323. O. nutans, *Hängendblütige Vogelmilch.* Im groſsen Garten am Teiche unter der kurz verſchnittenen Hainbuchenhecke zur linken Hand; in Reiſewitzens Garten.
24 May, Juny.

Aſparagus.

324. A. officinalis, *Spargel.* Auf Elbwieſen; auf Aeckern bey Neudorf, Pieſchen und Uibigau; in Weinbergen.
Offic. Aſparagi rad. 24 Juny, July.

Lilium.

325. L. bulbiferum, *Feuer-Lilie.* Am Geiſingsberge auf hohen Wieſen und im Haferlande; bey Altenberg am Aſchegraben und auf dem Winterwalde häufig.
24 Juny, July.

326. L. Martagon, *Gelbwurzliche Lilie,*
24 Juny, July. *Türkiſcher Bund.* An den Felſen der Neumühle gerade über, mit Digitalis ambigua; am Eingange in den Grund der Moritzburger Chauſſee-Einnahme gerade über, auf der Anhöhe zur rechten Hand, aber ſparſam.

Tulipa.

327. T. ſylveſtris, *Wilde Tulpe.* Im groſ-
24 May. Juny. ſen Garten hinter des Hofgärtners Wohnung an Buchenhecken und bey dem Palais im Graſe.

Acorus.

328. A. Calamus, *Kalmus.* In Cotta im
Offic. Calami aromatici ſ. Acori rad. niedern Teiche; bey Bernsdorf;
24 Juny, July. an der Röder und anderwärts.

Juncus.

329. J. conglomeratus, *Kugelriſpige*
24 Juny, July. *Simſe.* An Gräben und auf torfigen Wieſen, im Gebüſche u. ſ. w. gemein.

330. J. effusus, *Weitrispige Simse.* Blüh-
♃ Juny, July. het in Gesellschaft mit vorigem allenthalben.

331. J. filiformis, *Fadenförmige Simse.*
♃ Juny, July. In der Eule hinter Loschwitz auf nassen Wiesen; bey Weissig und an andern Orten auf wässrigen Wiesen.

332. J. Squarrosus, *Sparrige Simse.* Auf
♃ Juny, July. Sumpfwiesen gemein.

333. J. acutiflorus, (J. sylvaticus)
♃ July, August. *Spitzblümige Simse.* Auf nassen Wiesen allenthalben.

334. J. obtusiflorus, (J. articulatus)
♃ Juny, July. *Stumpfblumige Simse.* Mit vorigem gemein.

335. J. bulbosus, *Knollige Simse.* An
♃ Juny, July. der Elbe nach Loschwitz, und sonst gemein.

336. J. bufonius, *Kröten-Simse.* Auf
☉ Juny-- August. feuchten Wiesen, Aeckern und an Teichen.

337. J. ſupinus, (uliginoſus) (ſub-
24 July, Auguſt. verticillatus) *Wirtelblütige Simſe.* Bey Moritzburg und ſonſt auf naſſen Wieſen hin und wieder.

338. J. capitatus, (gracilis) *Köpfige*
⊙ Juny. July. *Simſe.* Bey Rähnis auf Wieſen und feuchten Aeckern, und anderwärts.

339. J. vernalis, (J. piloſus,) *Frühlings-*
24 May, Juny. *Simſe.* Im Gebüſche gemein.

340. J. albidus, (niveus) *Weiſsliche*
24 Juny, July. *Simſe.* Mit vorigem gemein.

341. J. campeſtris, *Feld-Simſe, Haſen-*
24 May, Juny. *brod.* Auf trocknen Wieſen und Hügeln allenthalben.

Peplis.

342. P. portula, *Portulak-Meyrich, Pe-*
⊙ Juny-- Auguſt. *plis.* Am Prieſsnitz- und Mordgrund-Bache; auf dem Serkewitzer Elbheger; in Lomnitz am Bache; bey Kunersdorf und Groſsröhrsdorf an der Röder, und an mehrern Orten.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Colchicum.

343. C. autumnale, *Herbſt-Zeitloſe, Wieſenſafran.* Auf Wieſen bey Cotta und anderwärts häufig.
Offic. Colchici rad. recens.
♃ Septbr. Octbr.

Triglochin.

344. T. paluſtre, *Dreyzack, Salzbinſe.* Bey Cotta am obern Teiche auf wäſsrigen Wieſen; auf den Niederauer Wieſen und den Naſſen häufig.
♂ May, Juny,

Rumex.

345. R. Britannica, (R. Hydrolapathum) *Brittanniſcher-Fluſs-Ampfer.* Bey der Pillnitzer Ziegelſcheune im Geſümpfe nach Söbrigen zu.
♃ Juny--Auguſt.

346. R. criſpus, *Krauſer Ampfer.* Auf Wieſen, Aeckern und in Gräben.
♃ Juny, July.

347. R. nemolapathum, (R. conglomeratus) *Wald-Ampfer.* In der Schleuſe bey dem Jüdenteiche und anderwärts nicht ſelten.
♃ Juny, July.

348. R. maritimus, *Meer-Ampfer.* Am Birkwitzer See; auf dem Serkewitzer Elbheger; an Moritzburger Teichen und Sümpfen und mehrern Orten.

⊙ July, August.

349. R. acutus, *Spitzblättriger Ampfer.* An feuchten schattigen Orten allenthalben.

Offic. Lapathi acuti rad.

24 Juny, July.

350. R. obtusifolius, *Stumpfblättriger Ampfer.* Mit vorigem in Gesellschaft; im grosen Gehäge an Gräben; im Ottowalder Grunde.

24 Juny-- August.

351. R. aquaticus, *Wasser-Ampfer.* Am Mühlgraben hinter der Plauenschen Mühle; auf dem Serkewitzer Heger am Elbstrome; an der Wesenitz und Elbe hin und wieder.

Offic, Herbae Britannicae s. Lapathi aquatici radix.

24 Juny, July.

352. R. acetosa, *Sauer-Ampfer.* Auf Wiesen gemein.

Offic. Acetosae nostratis rad. lib.

24 May, Juny,

353. R. Acetosella, *Kleiner Ampfer.* Auf
24 May, Juny. Brachen allenthalben.

Polygynia, *Vielweibige.*

Alisma.

354. A. plantago, *Wasser-Wegerich,*
24 July. August. *Froschlöffel.* In stehenden Wässern und Sümpfen gemein.

Classis VII.

Heptandria, *Siebenmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Trientalis.

355. T. europaea, *Europäische Trientalis, Sternblümchen, Schirmkraut.* ♃ May. Juny. Im Kaitzer Thale auf buschigen Anhöhen zur linken Hand; in Sörnewitz auf der sogenannten Bosel; zwischen Hohnstein und Schandau im Grunde vorne am Bache zur rechten Hand; in der Dresdner Heide hin und wieder.

Classis VIII.

Octandria, *Achtmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Epilobium.

356. E. anguſtifolium, *Schmalblätteriger Weiderich.* Unter dem Prieſsnitzer Pavillon an Felſen; über der Mordgrundbrücke an der Straſse zur linken Hand im Graben; im Zſchoner Grunde am Bache und in hohen Waldungen gemein.

♃ Juny-- Auguſt.

357. E. grandiflorum, (E. hirſutum,) *Groſsblümiger Weiderich.* In Cotta am Bache vor dem obern Teiche; im groſsen Garten im Graben vor der Krähenhütte, Strehla gerade über, und im Kaitzer Thale am Bache.

♃ July, Auguſt.

358. E. parviflorum, (E. villosum)
♃ July, August. *Kleinblümiger- Weichwolliger Weiderich.* Hinter Constappel im Prinzen-Grunde am Mühlteiche; zwischen Weinböhla, Ober- und Niederau auf einem Anger; hinter Oberau; unter Mobschatz in einem engen Thale im Gesümpfe; in Cotta am niedern Teiche.

359. E. montanum, *Berg-Weiderich.* Im
♂ July. August. Plauenschen Grunde am Mühlgraben und sonst im feuchten Gebüsche gemein.

360. E. tetragonum, *Vierkantiger Weiderich.* In Cotta am Bache; an
♃ July. August. der Gottleube.

361. E. palustre, *Sumpf-Weiderich.* An
♃ July. August. Moritzburger Teichen; hinter dem Heller im Erlenbruche und sonst im Gesümpfe, und auf wässrigen Wiesen gemein.

Oenothera.

362. O. biennis, *Zweyjährige Nachtkerze.*
♂ July, Auguſt. Auf den ſandigen Anhöhen bey dem Mordgrunde und anderwärts.

Erica.

363. E vulgaris, *Gemeine Heyde.* Im
♄ July—Septbr. Laub- und Nadelholze.

Vaccinium.

364. V. Myrtillus, *Heidelbeere.* Auf den
Offic. Myrtilli baccae. Loſchwitzer- und Wachwitzer
♄ May, Juny. Anhöhen im Gebüſche; in der Dresdner Heide.

365. V. Oxycoccos, *Moos-Beere.* Hin-
Offic. Oxycoccos baccae. ter Gottleube auf dem wüſten
♄ May, Juny. Schloſſe, mit V. oxycoccos und Eriophorum vaginatum ſparſam; bey Altenberg und Sächſ. Zinnwald in Waldungen häufig.

366. V. vitis idaea, *Preuſelbeere.* Auf
Offic. Vitis idaeae baccae. den Loſchwitzer- und Wachwitzer Anhöhen mit V. Myrtillus; in der Dresdner Heide.
♄ May, Juny.

367. V. uliginosum, *Trunkelbeere, Sumpf-Heidelbeere.* In der Dresdner Heide in Moorbrüchen; bey dem Liegauer Bade; vor Langebrück am Buschrande nach Lausa zu; auf den Ottendorfer Wiesen.

♄ May, Juny.

Daphne.

368. D. mezereum, *Kellerhals, Seidelbast.* Im Laubholze vor Costebaude; zwischen Costebaude und Niederwartha; bey Scharfenberg; am Windberge; im Rheinhardsgrimmschen- und Ottowalder Grunde, und an mehrern Orten

Offic. Laureolae s. Mezerei cortex, Coccognidii Semina.

♄ März, April.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Polygonum.

369. P. Bistorta, *Natterwurz, Wiesen-Knöterich.* Im Lockwitzer-Kreyschaer- und Rheinhardsgrimmschen Thale; in Bernsdorfer Grasgärten; auf den Reitzendorfer Wiesen bey der kleinen Bachmühle; in Somsdorf am Bache.

Offic. Bistortae rad.

♃ May, Juny.

370. P. amphibium, *Waſſer-Knöterich.*
4 Juny--Auguſt.
a) P. terreſtre, an feuchten Ackerrändern und Gräben; im groſsen Gehäge hinter dem Churfürſtl. Menageriegarten im Graben.
b) aquaticum. Im groſsen Gehäge im See; im Groſsengarten-Teiche und andern ſtehenden Gewäſſern; gemein.

371. P. Hydropiper, *Scharfer Knöterich.*
Offic. Perſicariae hb.
⊙ Auguſt, Septbr.
An feuchten Gräben und ſonſt gemein.

372. P. perſicaria, *Gemeinſter Knöterich.*
⊙ Juny--Auguſt.
Auf Aeckern und an Gräben mit vorigem allenthalben.

373. P. aviculare, *Vogel-Knöterich.* Im niedergetretenen Graſe und an Mauern und Wegen.
Offic. Centumnodiae hb.
⊙ July, Auguſt.

374. P. fagopyrum, *Buchweizen-Knöterich, Heydekorn.* In Weinbergen und auf Aeckern hin und wieder.
⊙ Juny. July.

375. P. Convolvulus, *Windender Knöterich.* ⊙ Juny, July. Auf Aeckern gemein.

376. P. dumetorum, *Hecken-Knöterich.* ⊙ July, August. An Hecken, Zäunen und Gesträuchen allenthalben, vorzüglich bey Potschappel und Zaukeroda; im Costebauder- Niederwarther- und Constappler Thale.

Tetragynia, *Vierweibige.*

Adoxa.

377. A. Moschatellina, *Bisamkraut.* 24 März-- May. Im Plauenschen- und Zschoner-Grunde im schattigen feuchten Gebüsche nicht selten.

Elatine.

378. E. Hydropiper, *Paarblättriger Wasserpfeffer.* ⊙ Juny, July. In den Moritzburger Schlosteichen hin und wieder.

Paris.

379. P. quadrifolia, *Einbeer.* Am Wind-
Offic. Paridis rad. hb. baccae. berge und über der Neumühle
24 May, Juny. jenseits der Weiseritz, wo ein steiler Fussteig durch das Gebüsche nach Koschütz hinauf führt, unter dem Haselgesträuche; auf buschigen Anhöhen unter Priesnitz und Costebaude; bey Wildberg und anderwärts.

Classis IX.

Enneandria, *Neunmännige.*

Hexagynia, *Sechsweibige.*

Butomus.

380. B. umbellatus, *Doldenblütige*
24 July. August. *Wasserviole.* Im Churfürstlichen Menagerie-Garten und kleinen Gehäge in Wassergräben; auf dem Serkewitzer Heger; im Neudorfer Elbgraben und in der Lache zwischen Uibigau und Kaditz; vor Tolkewitz und Loschwitz im Gesümpfe; hinter Brockwitz im kleinen Teiche.

Classis X.

Decandria, *Zehnmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Monotropa.

381. M. hypopithys, *Fichten-Spargel, Ohnblatt.* In der Dresdner Heide zuweilen, aber sparsam; im Blasewitzer Gehölze und auf den Loschwitzer Anhöhen; selten.

♃ Juny. July.

Ledum.

382. L. palustre, *Wilder Rosmarin, Grenze, Sumpf-Porst.* In der Dresdner- und Radeberger Heide in Moorbrüchen; sparsam.

Offic. Rorismarini sylvestris hb.

♄ Juny. July.

Pyrola.

383. P. rotundifolia, *Rundblättriges Wintergrün.* In der Schlucht hinter der Presse bey Wachwitz; auf dem Windberge gegen Abend und auf den Weisiger Anhöhen; im Nieder-Warthaer Grunde auf waldigen Anhöhen zur linken Hand; auf dem Gross-Cottaer Berge; auf dem Geisingsberge; bey dem Liegauer Bade und anderwärts.

Offic. Pyrolae hb.

♃ May. Juny.

384 P. minor, *Kleines Wintergrün.* Auf dem Borsberge bey dem Wasserfalle, und hinter Dittersbach eine Viertelstunde über Dobra im Kieferbüschgen; im Hoflösnitzgrunde und in den Seitenschluchten; auf den Weissiger Anhöhen, vorzüglich am Buschrande nach der Strasse hin und sonst nicht selten.
♃ May, Juny.

385. P. Secunda, *Einseitig blühendes Wintergrün.* Blühet mit vorigen beyden in Gesellschaft; auch bey Loschwitz in Neben-Schluchten; im Schloizer Grunde und in der Dresdner Hetde.
♄ May, July.

386. P. umbellata, *Doldenblütiges Wintergrün.* Auf der Loschwitzer Anhöhe im Nadelholze und in dasigen kleinen Schluchten; in der Dresdner Heide hin und wieder.
♄ Juny, July.

387. P. uniflora, *Einblumiges Winter-*
♃ June, July. *grün.* Auf dem Geisingsberge und bey Altenberg am Aschegraben im Gebüsche zur linken Hand; in der Dresdner Heide zuweilen.

Digynia, *Zweyweibige.*

Scleranthus.

388. S. annuus, *Jähriger Knauel.* Auf
⊙ June—August. Aeckern und Mauern.

389. S. perennis, *Dauernder Knauel.*
♃ May—July. Auf Aeckern gemein.

Chrysosplenium.

390. C. alternifolium, *Wechselblättri-*
♃ April, May. *ges Milzkraut.* In schattigen feuchten Waldungen und an kleinen Bächen.

391. C. oppositifolium, *Paarblättriges*
♃ April, May. *Milzkraut.* Hinter dem Fischhause am Eisenbrunnen und am verlornen Wasser; im Seyfersdorfer Thale am Wege zur Schenke hinauf rechts am kleinen Bache; im Ottowalder Grunde; an der Lockwitz im Friedewalde dem Kalkofen gegenüber.

Saxifraga.

392. S. granulata, *Körniger Steinbrech.* Auf Wiesen und sonst gemein.
Offic. Saxifragæ albæ rad.
♃ April—June.

393. S. tridactylites, *Dreytheiliger Steinbrech.* An der hintersten eingefallenen grosen Garten-Quermauer, zwischen den Grundsteinen, und sonst an und auf Mauern hin und wieder.
☉ May.

Gypsophila.

394. G. muralis, *Mauer-Gipskraut.* Auf Aeckern nach der Aerndte gemein.
♂ July, August.

Saponaria.

395. S. officinalis, *Seifenkraut.* In Loschwitzer- Wachwitzer- Niederboritzer- Weinböhlaer- und Oberauer Weinbergen; an der Elbe; auf der Elbinsel bey Söbrigen; gemein.
Offic. Saponariae rad. hb.
♃ July, August.

Dianthus.

396. D. Carthusianorum, *Cartheuser-*
24 June, July. *Feld-Nelke.* Auf trocknen Anhöhen allenthalben.

397. D. Armeria, *Büschel-Nelke.* Mit vo-
⊙ July, August. rigem an gleichen Orten.

398. D. prolifer, *Sprossende Nelke.* An
⊙ July, August. der Weiseritz auf dem Damme bey dem Pichhause häufig; bey Zitzschkowig in Weinbergsgassen auf Hügeln; am Eingange in den Plauenschen Grund jenseits der Weiseritz auf der Anhöhe u. s. w.

399. D. Superbus, *Stolze Nelke.* Im
♂ July, August. Zschoner Grunde auf der buschigen Anhöhe links; im Constappler Thale an gleichen Orten rechts; bey Pirna über den Copitzer Bergen und auf dem Gross-Cottaer Berge; bey Siebeneichen; auf den Wiesen der Nasse bey Gröbern herunter, und in der sogenannten Nasse selbst.

400. D. deltoides, *Deltafleckige Nelke.*
24 Juny, July. Auf trocknen Hügeln gemein.

401. D. caesius, *Graublättrige Nelke.* Im
24 Juny, July. Plauenschen Grunde bey der Brücke und jenseits der Weiseritz vor der Pulvermühle an Felsen; in Potschappel auf den Mauern der Bauerhöfe.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Arenaria.

402. A. trinervia, *Dreyribbiges Sand-*
⊙ May, Juny. *kraut.* Im Plauenschen Grunde an feuchten und schattigen Orten; im Reisewitzer Garten im Bosquet.

403. A. Serpyllifolia, *Quendelblättriges*
⊙ May, Juny. *Sandkraut.* Auf kiesigen und sandigen Aeckern und Brachen; auf dem neuen Anbau.

404. A. rubra, *Rothes Sandkraut.* Mit
⊙ Juny, July. vorigem hin und wieder; in der Dresdner Heide.

Stellaria.

405. S. nemorum, *Wald-Sternmiere.*
24 Juny, July. Im Loschwitzer- Costebauder- und Niederwarthaer Grunde an Bächen.

406. S. Holostea, *Grofsblütige Sternmiere.*
24 May. Im Plauenschen Grunde an der Weiseritz, vorzüglich an Felsen gegen Abend.

407. S. Alsine, *Sumpf-Sternmiere.* Mit
⊙ May, Juny. vorigem an gleichem Standort; an Quellen und feuchten schattigen Orten.

408. S. arvensis, (S. graminea,) *Gras-Sternmiere.* Im Grase gemein.
24 Juny, July.

409. S. palustris, *Wasser-Sternmiere.* An
24 Juny, July. Moritzburger Teichen und auf wäfsrigen Wiesen bey Moritzburg hin und wieder.

Cucubalus.

410. C. Behen, *Aufgeblasener Taubenkropf.* In Weinbergen und auf
24 Juny, July. sandigen Anhöhen allenthalben.

411. C. catholicus, *Allgemeiner* oder *Sicilianiſcher Taubenkropf.* Am Eingange in die Schlucht gleich hinter der Loſchwitzer Preſſe und in den benachbarten Weinbergen; auch vor genannter Preſſe am Wege in einer engen ſandigen Schlucht; am Fuſsſteige nach Zehiſt am Berge.

♃ Juny, July.

412. C. Otites, *Acker-Taubenkropf.* Vor Weinböhla im Bauernholze bey dem Lockwitzbache, am Wege, und im Gebüſche zur rechten Hand.

♃ Juny, July.

413. C. bacciferus, (Silene baccifera,) *Beerentragender Taubenkropf.* Bey Kötzſchenbroda am Fuſsſteige der hinter dem Dorfe wegführt, vor der Kirche an einer Weiſsdornhecke; hinter Cölln, gegen die Elbe zu von der Kirche gerade herunter; ſparſam.

♃ Juny–Auguſt.

Silene.

414. S. nutans, *Hängende Silene, Leim-*
24 May, Juny. *kraut.* Im Plauenſchen Grunde an Felſen und ſonſt nicht ſelten.

415. S. Armeria, *Nelken-Silene.* An Zäu-
⊙ May, Juny. nen und in Gärten im Graſe zuweilen; aber ſelten.

416. S. gallica, *Fränkiſche Silene.* Vor
⊙ July, Auguſt. Groſscotta auf Aeckern, vorzüglich in der Gerſte.

Pentagynia, *Fünfweibige.*

Sedum.

417. S. Telephium, *Knolliges Sedum.*
Offic. Telephii ſ. Craſſulae majores rad. Blühet an allen Orten.
24 July, Auguſt.

418. S. reflexum, *Zurückgebogenes Se-*
24 Juny, July. *dum.* Im Plauenſchen Grunde an Felſen und anderwärts.

419. S. album, *Weiſſes Sedum.* Am See-
24 July, Auguſt. thor- und Zwinger-Walle; auf dem Gräfl. Brühlſchen Garten zwiſchen den Mauern und ſonſt in den Vorſtädten auf Mauern hin und wieder.

420. S. acre, *Scharfes Sedum.* Mit nachfolgendem auf Mauern und trocknen Hügeln allenthalben.

Offic. Sedi minoris hb. 24 Juny, July.

421. S. ſexangulare, *Sechseckiges Sedum.* Mit vorigem in Geſellſchaft; gemein.

24 Juny, July.

Spergula.

422. S. arvenſis, *Acker-Spark.* Auf ſandigen Aeckern und Brachen gemein.

⊙ Juny-- Auguſt.

423. S. pentandra, *Fünffädiger Spark.* Mit vorigem zuweilen; hinter dem Heller-Weinberge zwiſchen dem Buſchrande und der Mauer.

⊙ April, May.

424. S. nodoſa, *Knotiger Spark.* Auf der Cottaer Wieſe bey dem obern Teiche im Graſe häufig mit Linum catharticum; zwiſchen Weinböhla, Ober- und Niederau auf einem Anger.

24 Juny-- Auguſt.

Ceraſtium.

425. C. vulgatum, *Gemeines Hornkraut.* Auf Aeckern und an Wegen.

⊙ April-- Juny.

426. C. viſcoſum, *Klebriges Hornkraut.*
⊙ May.-Auguſt. Blühet mit vorigem an allen Orten.

427. C. Semidecandrum, *Schutt-Hornkraut.* Hat gleichen Standort mit vorigen beyden; iſt aber ſehr ſelten.
⊙ April, May.

428. C. arvenſe, *Acker-Hornkraut.* Hinter dem Linkſchen Bade am Wege und ſonſt gemein.
♃ April. May,

429. C. aquaticum, *Waſſer-Hornkraut.* Im groſsen Gehäge hinter dem Menagerie-Garten im Graben; und ſonſt an Bächen und Gräben gemein.
♃ Juny.-Auguſt.

Agroſtemma.

430. A. Githago, *Korn-Raden.* Unter der Saat.
⊙ Juny, July.

Lychnis.

431. L. flos Cuculi, *Guckucks-Blume.* Auf feuchten Wieſen allenthalben.
♃ Juny, July.

432. L. viſcaria, *Pech-Nelke.* Mit vorigem in Geſellſchaft.
♃ May, Juny.

433. L. dioica, *Getrennte Lychnis, Ma-*
♃ Mai-- July. *rienröſel.*

Var. a) Sylveſtris. In feuchten Waldungen und an Bächen gemein.

b) arvenſis. Auf Ackerrändern und in Weinbergen.

Oxalis.

434. O. Acetoſella, *Sauer-Klee.* In
Offic. Acetoſellae hb. feuchten Gebüſchen und Waldun-
♃ April-- Juny. gen gemein.

435. O. corniculata, (O. ſtricta,) *Horn-*
♃ Juny-- Auguſt. *Klee.* Auf Aeckern hin und wieder; im Gartenlande.

Classis XI.

Dodecandria, *Zwölfmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Asarum.

436. A. europaeum, *Europäische Haselwurz.* In Thälern und Gründen, vorzüglich unter Haselsträuchern; allenthalben.

Offic. Asari rad. fol.

24 März, April.

Lythrum.

437. L. Salicaria, *Gemeiner Weiderich, Blutkraut.* Auf feuchten Wiesen, Aeckern und an Bächen gemein.

Offic. Salicariae s. Lysimachiae purpureae hb.

24 July, August.

438. L. hyſſopifolia, *Iſop-Weiderich.*

⊙ July, Auguſt. In Volkersdorf nach Bernsdorf zu, rechter Hand an Bauerhöfen mit Polygonum hydropiper und Inula pulicaria; im groſsen Gehäge am See, an der Elbſeite; auf den Niederauer Wieſen am Fuſsſteige von Weinböhla nach Meiſſen mit Chironia inaperta; am Ausgange der ſogenannten Naſſe auf den kleinen Aeckern unter Gröbern; Zwiſchen Niederau und Gröbern auf Aeckern an den naſſen Wieſen; am ſandigen Ufer des abgelaſſenen Zſchornaer Groſsteiches mit Corrigiola littoralis und Potentilla Norwegica.

Digynia, *Zweyweibige.*

Agrimonia.

439. A. Eupatoria, *Odermennig.* Auf Wieſen, grafigen Anhöhen und an Buſchrändern; gemein.

Offic. Agrimoniae hb. ♃ July, Auguſt.

Trigynia, Dreyweibige.

Reseda.

440. R. Luteola, *Wau-Resede.* Am Fahr-
⊙ May-- July. wege nach Strehla im Graben zur linken Hand; im kleinen Gehäge an der Weiseritz; auf Aeckern über dem Linkschen Bade an der Elbe, und auf der Elbinsel bey Söbrigen; aber sehr selten.

441. R. lutea, *Gelbe Resede.* Auf den
⊙ May-- July. äussern Festungswerken.

Euphorbia.

442. E. Peplus, *Garten-Wolfsmilch.* In
⊙ August. Septbr. Weinbergen, auf Aeckern und im Gartenlande.

443. E. exigua, *Kleine Wolfsmilch.* Auf
⊙ July. August. Aeckern nach der Aerndte; gemein.

444. E. dulcis, *Süsse Wolfsmilch.* Im
♃ May. June. Zschoner Grunde im schattigen Gebüsche und an mehrern dergleichen Orten.

445. E. Paralias, *Sand-Euphorbie, Meer-*
24 May-- August. *Wolfsmilch.* Zwischen Kötzschenbroda und Kötitz am Elbstrande, Nieder-Wartha gerade über mit E. Esula; sparsam.

446. E. helioscopia, *Sonnenzeiger-Wolfsmilch.*
⊙ June-- August. Hat mit E. peplus gleichen Standort.

447. E. platyphyllos, *Flachblättrige*
⊙ July. August. *Wolfsmilch.* In Eisenberg unter den Weiden in Menge.

448. E. Esula, *Gemeine Wolfsmilch.* Auf
Offic. Esulae cortex, extractum.
24 May-- July. trocknen unfruchtbaren Hügeln; an der Elbe nach Loschwitz u. s. w.

449. E. Cyparissias, *Cypressenartige*
24 May-- July. *Wolfsmilch.* Hat mit vorigem gleichen Standort.

450. E. degener, (sterilis) *Geschlechts-*
24 May, June. *lose Wolfsmilch.* Im Plauenschen Grunde an Felsen zur rechten Hand hin und wieder.

Dodecagynia, *Zwölfweibige.*

Sempervivum.

451. S. tectorum, *Hauslaub, Hauswurzel.* In der Schlucht hinter der Löschwitzer Presse an Felsen; um Altenberg auf Ackerrändern und an Wegen; auf Mauern und Dächern.

Offic. Sempervivi f. Sedi majoris hb.

24 July, August.

Classis XII.

Icosandria, *Zwanzigmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Philadelphus.

452. P. coronarius, *Pfeiffenstrauch, Wilder Jasmin.* Im Seyfersdorfer Thale; an Gartenzäunen hin und wieder. ♄ May, Juny.

Prunus.

453. P. Padus, *Ahlkirsche.* Im Loschwizzer- und Plauenschen Grunde; bey Potschappel häufig. ♄ May, Juny.

454. P. Cerasus, *Gemeine Kirsche.* Auf dem Gräfl. Brühlschen Garten an der Elbmauer. Unter Nieder-Wartha auf der buschigen Anhöhe links mit Mespilus Germanica; auf der Bosel; im Plauenschen Grunde zwischen der Brücke und Buschmühle linker Hand an Felsen, und anderwärts. ♄ May, Juny.

455. P. avium, *Vogelkirsche.* Auf den An-
Offic. Cerasorum nigrorum fructus, Nuclei.
höhen bey Nieder-Wartha; bey Rheinhardsgrimme und Luga.
♄ May.

456. P. Spinosa, *Schwarzdorn, Schlehendorn.* Blühet mit vorigen und sonst allenthalben.
Offic. Acaciae nostratis flores.
♄ April, May.

Digynia, *Zweyweibige.*

Crataegus.

457. C. Oxyacantha, *Weissdorn, Hagedorn.* Im Plauenschen Grunde; auf der Remise und sonst in Gesellschaft mit vorigem gemein.
♄ May, Juny.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Sorbus.

458. S. aucuparia, *Ebereesche.* Im Plauenschen Grunde; hinter der Loschwitzer Presse in der Schlucht und auf dem Gräfl. Brühlschen Garten an der Barriere; im Laubholze hin und wieder.
Offic. Sorbi aucupariae baccae.
♄ May, Juny.

Pentagynia, *Fünfweibige.*

Mespilus.

459. M. germanica, *Gemeine Mispel.* Im ♄ May, Plauenschen Grunde vor dem Eisenhammer auf der buschigen Anhöhe rechter Hand; desgleichen auch auf der buschigen Anhöhe gleich unter Nieder-Wartha, mit Prunus Cerasorum und am Eingange des Thales; auf der Bosel bey Sörnewitz.

460. M. Cotoneaster, *Quitten-Mispel.* ♄ May, Juny, Im Plauenschen Grunde an den steilen Felsenabhängen zwischen der Brücke und Buschmühle; auch hinter des Hegereuters Wohnung auf der Anhöhe an einer niedrigen Mauer.

Pyrus.

461. P. communis, *Feldbirne, Holzbirne.* ♄ May, Juny. Bey Nieder-Wartha, Gauernitz und Costebauda; bey dem Windberge; auf dem Gross-Cottaer Berge und an mehrern Orten.

462. P. Malus, *Holzapfel.* Im Plauenschen Grunde vor dem Eisenhammer auf der buschigen Anhöhe und bey Hainsbach; am Windberge und sonst mit vorigem in Gesellschaft.
♄ May, Juny.

Spiraea.

463. S. Aruncus, *Geisbart-Spierstaude.* Im Plauenschen Grunde jenseits der Weiseritz, bey der Busch-Königs- und Neumühle im Gebüsche; in Nieder-Warthaer Thale u. s. w.
24 July.

464. S. Filipendula, *Knollige Spierstaude.* Auf Elbwiesen gemein.
Offic. Saxifragae rubrae rad.
24 Juny, July.

465. S. Salicifolia, *Weidenblättrige Spierstaude.* Im Seyfersdorfer Thale; in Moritzburg an der Höllenburg.
♄ July.

466. S. Ulmaria, *Sumpf-Spierstaude.* Auf feuchten Wiesen; an Bächen und Gräben allenthalben,
Offic. Ulmariae s. Barbae caprinae rad, hb. flores.
24 Juny, July.

Polygynia, *Vielweibige.*

Rosa.

467. R. canina, *Hanbutten- Hecken-Rose.*
Offic. Rosae sylvestris flores, cynosbati fructus, semina.
♄ Juny, July.
An Hecken und Zäunen.

468. R. rubiginosa, *Rostfarbige* oder *Wein-Rose.*
♄ Juny, July.
In Moritzburg in der Allee; bey Kötzschenbroda; in Brockwitz an Gartenhecken und vor Meissen dieſſeits und jenſeits der Elbe.

469. R. alba, *Weisse Rose.*
Offic. Rosae albae flor.
♄ Juny, July.
Im Plauenſchen Grunde auf Anhöhen vor und hinter Koschütz; in Grasgärten an Zäunen.

470. R. villosa, *Weichhaarige Rose.*
♄ Juny, July.
Vor Seyfersdorf am Wege; unter Gauernitz vor Meissen; am Eingange in den Nieder-Warthaer Grund; auf den Weisiger Anhöhen und sonst hin und wieder mit R. rubiginosa.

471. R. arvensis, *Brach-* oder *Feld-Rose.*
♄ Juny. Auf Aeckern hinter Plauen und Koschütz.

Rubus.

472. R. idaeus, *Himbeere.* Unter der Barriere auf dem Gräfl. Brühlschen Garten; im Gamiger Büschgen; bey Potschappel und Zauckeroda; im Liebethaler- und Zschoner-Grunde, und sonst gemein.
Offic. Rubi idaei fructus.
♄ May, Juny.

473. R. caesius, *Krätzbeere, Kriechende Himbeere.* Am Elbwege nach Loschwitz zur linken Hand; auf der Elbinsel bey Söbrigen in Menge; und sonst an allen Orten.
♄ Juny, July.

474. R. fruticosus, *Brombeere, Strauchartige Himbeere.* An Zäunen und Hecken.
Offic. Rubi nigri fructus.
♄ Juny, July.

Tormentilla.

475. T. erecta, *Aufrechte Tormentill, Ruhrwurz.* In Waldungen und auf Buschwiesen; gemein.
Offic. Tormentillae rad
♃ Juny, July.

476. T. reptans, *Liegende Tormentill.* Hat
24 Juny, July. gleichen Standort mit vorigem; selten.

Fragraria.

477. F. vesca, *Erdbeere.* In Thälern,
Offic. Fragariae hb. fructus. Gründen und auf Bergen; in
24 May. Waldungen und Weinbergen; gemein.

478. F. sterilis, *Trockene Erdbeere.* Im
24 July. Plauenschen- und Constappler-Grunde auf Anhöhen zur rechten Hand; aber sehr selten.

Potentilla.

479. P. Anserina, *Gänserich-Fingerkraut.*
Offic. Anserinae rad. hb. Auf Weiden gemein.
24 May, July.

480. P. Supina, *Niedriges Fingerkraut.*
⊙ Juny, July. Im Ostra-Holzhofe und im kleinen Gehege in Gräben; auf dem Serkewitzer Heger am Elbstrome; bey Pillnitz an den Churfürstlichen Ställen und sonst hin und wieder; sparsam.

481. P. argentea, *Silberblättriges Fingerkraut.* Im Plauenschen Grunde und sonst auf Mauern und Dächern allenthalben. ♃ May, Juny.

482. P. recta, *Gerades Fingerkraut.* Im Plauenschen Grunde jenseits der Weiseritz, dem Hegereuter gerade über; auch hinter dessen Wohnung an Felsen und auf Anhöhen; und sonst nicht selten. ♃ Juny, July.

483. P. opaca, *Schattenliebendes Fingerkraut.* Ueber dem Linkschen Bade auf dem Sandhügel an der Elbe im Busche; im Plauenschen Grunde auf der Anhöhe über dem Hegereuter, und an mehrern Orten. ♃ July.

484. P. verna, *Frühlings-Fingerkraut.* Im Plauenschen Grunde und sonst gemein. ♃ April, May.

485. P. alba, *Weisses Fingerkraut.* Vor Radebeul auf der Anhöhe bey der grosen Sumpfwiese mit P. verna und Anemone pratensis. ♃ April, May.

486. P. reptans, *Kriechendes Fingerkraut.* An Wegen allenthalben.
Offic. Pentaphylli s. quinquefolii rad. hb.
24 Juny, July.

487. P. norvegica, *Norwegisches Fingerkraut.* An den sandigen Ufern der abgelassenen Teiche bey Dippelsdorf und Lausa mit Carex Cyperoides, Illecebrum verticillatum u. s. w. sparsam; am obern und niedern Waldteiche hinter Volkersdorf; in dem abgelassenen Gross-Teiche bey Zschorna häufig mit Corrigiola littoralis und Ill. verticill.; auf den hohen Dämmen des Moritzburger Mittelteiches.
⊙ Juny, July.

Geum.

488. G. urbanum, *Benedictwurz, Nelkenwurz.* Im grossen Garten und sonst im Laubholze gemein.
Offic. Caryophyllatae rad.
24 May, Juny.

489. G. rivale, *Wasser-Benedictwurz.*
Offic. Gei palustris rad. ♃ May-- July. Im Plauenschen Grunde an der Weiseritz bey der Königs- und Neumühle und anderwärts; sehr sparsam. Häufig bey Lauenstein, Geising und Altenberg; am Geisingsberge.

Comarum.

490. C. palustre, *Sumpf-Comarum.* Im
♃ Juny. July, Gesümpfe und an Teichen gemein.

Claſſis XIII.

Polyandria, *Vielmännige.*

Monogynia, *Einweibige.*

Papaver.

491. P. Argemone, *Sand-Mohn.* Auf Sandäckern bey Rähnis, Klotſcha, Lauſa, Hermsdorf, Boxdorf und Kötzſchenbroda.

⊙ Juny, July.

492. P. Rhoeas, *Klatſchroſen, Wilder Mohn.* Auf den fruchtbaren Aeckern bey Cotta, Lübtau, Strehla und Leubnitz u. ſ. w. ſehr häufig.

Offic. Papaveris Erratici ſ Rhoeadis flores.

⊙ Juny, July.

493. P. dubium, *Acker-* oder *Feld-Mohn.* Auf dem Damme unter Coſtebaude und ſonſt mit vorigen beyden in Geſellſchaft.

⊙ Juny. July.

494. P. Somniferum, *Garten-Mohn.* Unter der Saat und ſonſt hin und wieder.

Offic. Papaveris ſemina alba, Capitula.

⊙ Juny, July.

Chelidonium.

495. C. majus, *Groſs-Schöllkraut.* An feuchten Mauern, kleinen Bächen und ſchattigen Orten gemein.
Offic. Chelidonii majoris rad. hb.
24 May, Juny.

Actaea.

496. A. Spicata, *Aehrentragendes Chriſtophskraut.* Im Plauenſchen Grunde und auf dem Windberge gegen Norden; auf den buſchigen Anhöhen vor Coſtebaude, Niederwartha und anderwärts.
24 May, Juny.

Ciſtus.

497. C. Helianthemum, *Ciſten-Roſe.* Auf den Plauenſchen Anhöhen; bey Moritzburg am Wege zur Höllenburg; in der Heide und an mehrern Orten.
♄ Juny, July.

Tilia.

498. T. grandifolia, *Groſsblättrige* oder *Weiche Linde.* Im Laubholze.
Offic. Tiliae flores.
♄ Juny, July.

499. T. parvifolia, *Kleinblättrige* oder
ħ Juny, July. *Stein-Linde.* Mit vorigem.

Nymphaea.

500. N. lutea, *Gelbe Seeblume.* Im grosen
24 Juny, July. Gehäge im See; bey Mockeritz, Volkersdorf und anderwärts in Teichen.

501. N. alba, *Weisse Seeblume.* Im Birk-
Offic. Nymphaeae albae rad. flor. witzer See; bey Langebrück und Moritzburg in Teichen; im Egel-
24 Juny, July. see und sonst gemein.

Trigynia, *Dreyweibige.*

Delphinium.

502. D. Consolida, *Ritter-Sporn.* Unter
Offic. Consolidae Regalis f. Calcatrippae flores. der Saat gemein.

⊙ Juny, July.

Pentagynia, *Fünfweibige.*

Aquilegia.

503. A. vulgaris, *Gemeiner Ackeley.* Bey Seyfersdorf an der Röder; vor Weesenstein im Gebüsche am Wasser mit Thalictrum aquilegifolium; bey Berggiesshübel am Bache; aber sehr sparsam.

Offic. Aquilegiae semina, flores.
♃ Juny, July.

Nigella.

504. N. arvensis, *Wilder Schwarzkümmel, Acker-Nigelle.* Auf Aeckern unter Uibigau, vorzüglich bey den daran gränzenden Elbwiesen; zwischen Niederau und Gröbern.

☉ Juny—Augusst.

Polygynia, *Vielweibige.*

Clematis.

505. C. erecta, *Aufrechte Waldrebe.* Auf Elbwiesen; im Gebüsche bey Kostebaude und Niederwartha; auf der Bosel; vor Meissen an der Elbe am rechten und linken Ufer.

Offic. Flammulae Jovis hb.
♃ Juny, July.

Thalictrum.

506. T. minus, *Kleines Thalictrum.* Auf
24 Juny, July. Elbwiesen und sonst gemein.

507. T. angustifolium, *Schmalblättriges*
24 July. August. *Thalictrum.* Mit vorigem gleichen Standort.

508. T. flavum, *Gelbes Thalictrum.* Auf
24 July. August. Wiesen bey Pirna und Zehist; am Egelsee auf der grasigen Anhöhe; auf den Niederauer Wiesen; sparsam.

509. T. aquilegifolium, *Ackeleyblättri-*
24 Juny, July. *ges Thalictrum.* An der Weisseritz hin und wieder; im Seyfersdorfer Thale an der Röder; bey Siebeneichen; bey Weesenstein; am Wesenitz-Bache im Gebüsche und anderwärts.

Caltha.

510. C. palustris, *Schmergelu, Kuhblume.*
24 April. May, An Bächen, Gräben und im Gesümpfe; gemein.

Anemone.

511. A. Hepatica, *Dreylappige Anemone, Leberkraut.* Im Plauenſchen Grunde im Gebüſche gemein.

Offic. Hepaticae nobilis hb. flor.
24 März, April.

512. A. pratenſis, *Wieſen-Anemone, Schwarze Küchenſchelle.* Auf dem Sandhügel bey dem Pillnizzer Fährhäusgen; über Laubegaſt am Zſchachwitzer Bache auf ſandigen Anhöhen und bey Zſchachwitz am Gehölze; an der Elbe zwiſchen Blaſewitz und Tolkewitz auf ſandigen Hügeln; bey Wachwitz auf Anhöhen und in Weinbergen; bey Radebeul am Gebüſche; auf der Boſel; gemein.

Offic. Pulſatillae nigricantis hb.
24 April, May.

513. A. nemoroſa, *Wald-Anemone.* In ſchattigen Waldungen gemein.

Offic. Ranunculi albi flores et herba recens.
24 April, May.

514. A. ranunculoides, *Ranunkelartige*
24 April, May. *Anemone.* Im Plauenschen Grunde über der Pulvermühle jenseits der Weiseritz nach Potschappel zu, im Gesträuche; auf dem Lugaer Berge; bey Wildberg, und anderwärts.

Ranunculus.

515. R. Flammula, *Beissender Ranunkel.*
24 May--Septbr. Auf nassen Wiesen allenthalben.

516. R. reptans, *Schleichender* oder *Feinblättriger Ranunkel.*
24 Juny, July. Ueber dem Heller auf Sumpfwiesen und im Erlenbruche; bey Moritzburg auf Wiesen; mit vorigem gemein.

517. R. Lingua, *Grosser Ranunkel.* Im
24 Juny, July. Egelsee; bey Pirna auf der Viehleite im Gesümpfe mit Arundo phragmites et Calamagrostis; in den Moritzburger- und Zschornaer Teichen; auf den Nassen in den alten Schanzgräben; aber nicht häufig.

518. R. Ficaria, *Feigwarzen-Ranunkel.*
Offic. Chelidonii minoris rad. hb.
24 April, May.
An Bächen, Gräben und auf Wiesen gemein.

519. R. auricomus, *Gold-Ranunkel.* Auf
24 April, May.
nassen Wiesen bey Klotzscha, Rähnis und Moritzburg; im Prinz Antonschen Garten auf Grasplätzen; gemein.

520. R. Sceleratus, *Gift-* oder *Blasenziehender Ranunkel.* In Gräben,
⊙ Juny, July.
Sümpfen und in stehenden Gewässern allenthalben; auf der Radebeuler Sumpfwiese.

521. R. bulbosus, *Knolliger Ranunkel.*
24 May, Juny.
Auf Wiesen gemein.

522. R. repens, *Kriechender Ranunkel.*
24 May. Juny.
Auf feuchten Aeckern, Wiesen, und an Gräben.

523. R. acris, *Scharfer Ranunkel.* Auf
24 May—August.
Wiesen und sonst allenthalben.

524. R. polyanthemos, *Vielblumiger*
24 May, Juny.
Ranunkel. Im Kreyschaer Thale und auf den Nassen; sparsam.

525. R. lanuginosus, *Wolliger Ranunkel.*
24 May, Juny. Im Zschoner- Costebauder- und Niederwarthaer Grunde an Bächen, und anderwärts.

526. R. arvensis, *Acker-Ranunkel.* Auf
⊙ May, Juny. Aeckern unter der Saat gemein.

527. R. heterophyllus, *Verschieden-blättriger Wasser-Ranunkel.*
24 Juny, July. In Bächen und Teichen.

528. R. aquatilis, *Wasser-Ranunkel.* Mit
24 Juny, July. vorigem gemein.

529. R. fluviatilis, *Fluss-Ranunkel.* In
24 July, August. der Gottleube und im Wesenitzbache sehr häufig; desgleichen im Zschachwitzer Lustgarten.

Adonis.

530. A. aestivalis, *Sommer-Adonis.* Auf
⊙ May, Juny. Aeckern bey Plauen, Cotta, Leutewitz, Ober- und Niederau u. s. w.

Trollius.

531. T. europaeus, *Europäiſche Troll-*
24. Juny, July. *blume.* Ueber Gottleube auf den Stadtwieſen, am Fahrwege nach Oelſsa; zwiſchen Markersbach und Höllendorf auf Wieſen; am Geiſingsberge.

Helleborus.

532. H. viridis, *Grüne Nieſswurz.* Unter
24. May, Juny. Niederwartha, ungefähr 100 und einige Schritte auf der buſchigen Anhöhe zur linken Hand in einer kleinen Schlucht.

Classis XIV.

Didynamia, *Zweymächtige.*

Gymnospermia, *mit nacktem Saamen.*

Leonurus.

533. L. Cardiaca, *Gemeiner Wolfstrapp.*
Offic. Cardiacae hb. ♃ July, August. An den sogenannten Dreschерhäusern, und sonst an Zäunen und in Dörfern; gemein.

Glecoma.

534. G. hederacea, *Gundermann.* An allen Orten gemein.
Offic. Hederæ terrestris hb. ♃ April, May.

Mentha.

535. M. Sylvestris, *Wilde* oder *Rofs-Münze.* In Cotta und Costebaude am Bache; im grofsen Garten über dem mittelsten Thore zur rechten Hand, in einem Graben vor der Krähenhütte mit Epilob. grandiflor. und Symphyt. majus u. s. w. gemein.
Offic. Menthæ sylvestris hb. ♃ July, August.

536. M. aquatica, *Wasser-Münze.* An Bä-
♃ July, August. chen und Teichen gemein.

537 M. arvensis, *Acker-Münze.* Auf Aek-
♃ July--Septbr. kern und sonst gemein.

Teucrium.

538. T. Scorodonia, *Skorodonien-Ga-*
♃ August. *mander.* Am Fusssteige von Lomnitz nach Grossnaundorf, ungefähr 60 Schritte vor dem durchfliessenden Bache, zwischen dem Gesträuche.

539. T. Chamaedrys, *Bathengel, Gemei-*
Offic. Chamaedryos hb. *ner Gamander.* Am Fusssteige
♃ July--August. an der Elbe von Stadt Wehlen nach Rathen an einer Mauer zur linken Hand, ungefähr 200 Schritte unter der Ruine und dem darunter befindlichen Forsthause und Lehngerichte; sehr sparsam.

Ajuga.

540. A. genevensis, (pyramidalis)
Offic Consolidae mediae hb. *Gilden-Günsel.* Auf Wiesen
♃ May, July. im grossen Garten, und sonst gemein.

541. A. reptans, *Kriechender Günsel.*
24 May, Juny. Blühet mit vorigem in Gesellschaft gemein.

Betonica.

542. B. officinalis, *Officinelle Betonien.*
Offic. Betonicae hb. flor.
24 Juny, July. Auf den Niederauer Wiesen und den Nassen sehr häufig, und sonst auf Wiesen und an Buschrändern gemein.

Lamium.

543. L. maculatum, *Gefleckter Bienensaug.*
24 April, May. An Hecken, Zäunen und an schattigen Orten hin und wieder.

544. L. album, *Weisse Taubenessel, Weisser Bienensaug.* Blühet allenthalben.
Offic. Lamii albi s. Urticae mortuae hb. flor.
24 May--August.

545. L. purpureum, *Rother Bienensaug.*
⊙ May--August. Auf Aeckern und sonst gemein.

546. L. amplexicaule, *Stengelumfassender Bienensaug.* Mit vorigem allenthalben.
⊙ May, Juny.

547. L. Galeobdolon, (Leonurus Galeobdolon,) *Gelber Bienensaug.* Im Plauenschen und Zschoner Grunde im schattigen Gebüsche. ♃ July, August.

Galeopsis.

548. G. Ladanum, *Schmalblättriger Hohlzahn.* Auf Sandäckern bey Trachau, Serkewitz, Hoflösnitz, und anderwärts. ☉ July, August.

549. G. Tetrahit, *Gemeiner Hohlzahn.* Auf Aeckern, steinigen Hügeln und andern Orten; allenthalben. ☉ July--Septbr.

550. G. cannabina, *Schöner Hohlzahn.* Bey Zaukeroda und im Zschoner Grunde; auch anderwärts an Bächen und schattigen feuchten Orten. ☉ July--Septbr.

Stachys.

551. S. Sylvatica, *Wald-Zieſt.* Bey Pillnitz im Friedrichsthale und im Gamiger Luſtholze an Bächen; bey dem Liegauer Bade im feuchten Gebüſche und vor Niederwartha in den buſchigen Schluchten; nicht ſelten.
⊙ July. Auguſt.

552. S. paluſtris, *Sumpf-Zieſt.* Auf feuchten Aeckern, Wieſen und an Bächen allenthalben.
♃ July. Auguſt.

553. S. germanica, *Teutſcher Zieſt.* Zwiſchen Burgſtädtel und Unſewitz auf einem tiefliegenden Anger; am Wege von Koſchütz zur Pulvermühle hinunter zur rechten Hand am Berge; nicht häufig.
♃ July, Auguſt.

554. S. annua, *Jähriger Zieſt, Berufkraut.* Auf dem Serkewitzer Heger am Elbſtrome nnd bey Pirna am Kohlberge; ſehr ſelten.
⊙ Juny, July.

555. S. recta, *Gerader Zieſt.* An der Elbe bey dem Mordgrunde; im Plauenſchen Grunde zur rechten Hand an Felſen; von Sörnewitz bis Meiſſen an gleichen Orten.
♃ May-- Auguſt.

Nepeta.

556. N. cataria, *Katzen-Münze*, In der
Offic. Nepetae s. Catariae hb. Zwinger-Allee wo die Stadtgra-
24 July, August. ben-Barriere sich endiget; inwendig an der Mauer; bey Uebigau und in Costebaude in Weinbergen; am Eingange in das Dorf Wehlen zur linken Hand an einer Gartenmauer, und anderwärts auf altem Gemäuer zuweilen.

Ballota.

557. B. nigra, *Schwarze Ballote*. An Zäu-
24 Juny-- August. nen und Hecken allenthalben.

Marrubium.

558. M. vulgare, *Weisser* oder *Gemeiner*
Offic. Marrubii albi hb. *Andorn*. Auf Angern, altem Ge-
24 July, August. mäuer, trocknen Hügeln und an Wegen nicht selten.

Melittis.

559. M. melissophyllum, *Wald-Melisse,*
24 Juny. July. *Melissenblättrige Melittis.* Im Dohnaer Kirchenholze häufig mit Daphne Mezereum und Astrantia major; unter Mobschatz im Laubholze sparsam; bey Niederwartha desgleichen; an der Pirnaischen Strasse über Heidenau im Klein-Sedlitzer Laubholze.

Scutellaria.

560. S. galericulata, *Fieberkraut, Gemeines Helmkraut.* An Gräben, Teichen und feuchten Mauern; gemein.
24 July August.

Thymus.

561. T. Serpyllum, *Feld-Kümmel, Quändel, Feld-Thymian.*
Offic. Serpylli hb.

ħ Juny-Septbr.
Var. vulgaris, V. ciliata, V. citrina, } Im Plauenschen Grunde und sonst auf Brachen, dürren Hügeln, und an steinigen Orten; gemein.

562. T. Acinos, *Stein-Quändel, Berg-*
⊙ July, August. *Thymian.* Im Plauenschen Grunde an Felsen und sonst mit vorigem in Gesellschaft; nicht selten.

Prunella.

563. P. vulgaris, *Gemeine Brunelle.* Auf
Offic. Prunellae hb. Wiesen gemein.
24 July--Septbr.

Origanum.

564. O. vulgare, *Gemeiner Dosten,*
Offic. Origani vulgaris hb. *Wohlgemuth.* Im Plauenschen- und Constappler Grunde auf Anhöhen zur rechten Hand. Hinter Weisig an einem kleinen buschigen Hügel und anderwärts; gemein.
24 July, August.

Clinopodium.

565. C. vulgare, *Gemeine Wirbelborste.*
24 July, August. Auf buschigen Anhöhen mit vorigem in Gesellschaft; häufig.

Angiospermia, *mit bedecktem Saamen.*

Orobanche.

566. O. major, *Grofse Sommerwurz,* ♃ May—July. *Hanfwürger.* In den Loschwitzer Weinbergen und auf der Bosel; vor Gröbern im Gesträuche am Ausgange der Nassen, und sonst zuweilen.

Lathraea.

567. L. Squamaria, *Schuppenwurz.* Bey ♃ April, May. Pillnitz im Friedrichsthale; im Plauenschen Grunde in der Schlucht hinter dem Wasserpalais und am Windberge gegen Norden; im Zschoner Grunde am Bache, und bey Costebaude und Niederwartha im schattigen Gebüsche; über dem Schlosse Weesenstein im Grunde, im hohen Buchenwalde zur linken Hand, wo Ophrys nidus avis und Arum maculatum wächst, und an mehrern Orten.

Euphrasia

568 E officinalis, *Gewöhnlicher Augentroſt.* Auf Wieſen und Triften an allen Orten.

Offic Euphrasiae hb. ⊙ July--Septbr.

569. E. Odontites, *Rother Augentroſt.* In Cotta am Bache nach dem obern Teiche zu, und ſonſt an Ackerrändern nicht ſelten.

⊙ July, Auguſt.

Rhinanthus.

570. R. Criſta Galli, *Klapper, Hahnenhanm.* Auf Aeckern und Wieſen.

⊙ May-- July.

Melampyrum.

571. M. arvenſe, *Acker - Wachtelweize.* Unter der Saat bey Cotta, Unſewitz, Leutewitz und anderwärts.

⊙ Juny, July.

572. M. criſtatum, *Kammförmiger Wachtelweize.* Auf den buſchigen Anhöhen bey Niederwartha; auf der Boſel und an andern Orten.

⊙ Juny-- Auguſt.

573. M. nemoroſum, *Hainen - Wachtelweize.* In ſchattigen Hainen gemein.

⊙ Juny, July.

574. M. pratense, *Wiesen-Wachtelweize.*

⊙ July, August. Mit vorigen beyden in Gesellschaft und sonst allenthalben.

575. M. Sylvaticum, *Wald-Wachtelweize.*

⊙ June—August. Vor Nieder-Wartha im Laubholze in den kleinen Berg-Schluchten, sparsam; bey Bärenstein, Geysing und Altenberg, an Buschrändern; häufig.

Scrophularia.

576. S. nodosa, *Knotige Braunwurz.* An Bächen und feuchten schattigen Orten allenthalben.

Offic. Scrophulariae foetidae rad.

♃ June, July.

577. S. aquatica, *Wasser-Braunwurz.* In Cotta im Bache; im grosen Garten im Wassergraben, wo der Weg auf dem Damme zum Fasanenwärter hin führt, hinter der Krähenhütte; im Rheinhards-grimmschen Grunde auf waldigen Anhöhen zur rechten Hand an kleinen Bächen; am Ufer der Gottleube und anderwärts zuweilen.

Offic. Scrophulariae aquaticae hb.

♂ July—Septbr.

578. S. vernalis; *Frühlings-Braunwurz.*

♂ May, Vor dem Pirnaischen Schlage am Prinz Antonschen Garten in einem sogenannten Haha, neben dem Pavillon; im grofsen Garten dem Fasanenwärter gegenüber im Laubholze; sehr sparsam.

Digitalis.

579. D. purpurea, *Rother Fingerhut.*

Offic. Digitalis purpureae hb. Zwischen Bärenstein und Altenberg auf steinigen Hügeln und Feldrändern; im Seyfersdorfer Thale.

♂ Juny—Augusf.

580. D. ambigua, *Blafsgelber Fingerhut.*

♃ July, August. Am Fufssteige von Planen nach Koschütz, an der Anhöhe die zur Schlucht nach der Bufsmühle hinunter führt; desgleichen der Neumühle gerade über an Felsen und am Windberge, im Maxner und Schloizer Grunde und bey Glashütte.

Limosella.

581. L. aquatica, *Wasser-Limoselle.*

24 July--Septbr. Auf dem Serkewitzer Heger; an Teichen und andern überschwemmten Orten.

Antirrhinum.

582. A. cymbalaria, *Eckiges Löwenmaul.*

24 May--July. An den Pfeilern der Elbbrücke; an Stadt- und Weinbergsmauern.

583. A. Elatine, *Liegendes Löwenmaul.*

⊙ July, August. Auf den zwischen Strehla und Leubnitz liegenden Aeckern hin und wieder; auf den kleinen Aeckern am Ausgange der Nasse unter Gröbern, mit Chironia inaperta und Lythrum hyssopifolia; zwischen Niederau und Gröbern auf Aeckern an den Nassen.

584. A. arvense, *Acker-Löwenmaul.* Auf

⊙ Juny--Septbr. Aeckern und an Feldwegen bey Uebigau und Kaditz; Am Weiseritzufer über und unter der Ostrabrücke; sparsam.

585. A. minus, *Kleines Löwenmaul.* Am
⊙ August, Septbr. sandigen Elb- und Weiseritzufer; an den Weinbergsmauern zum Mordgrunde hin, und anderwärts.

586. A. Linaria, *Gemeines Löwenmaul,*
Offic. Linariae hb. *Frauenflachs.* Auf Aeckern und Mauern.
24 July, August.

587. A. Orontium, *Wild-Löwenmaul,*
⊙ July, August. *Dorant.* Im Plauenschen Grunde bey dem Eisenhammer auf Aeckern; desgleichen zwischen Döhlen und Weissig; bey Schönborn, Hermsdorf, Grosnaundorf auf Aeckern; im Constappler Thale auf der Anhöhe zur rechten Hand bey den Harthaer Weinbergen, und anderwärts.

Pedicularis.

588. P. palustris, *Sumpf-Läusekraut.*

Offic. Pedicularis aquaticae hb. recens.

⊙ Juny, July.

Auf feuchten Buschwiesen und auf den nassen Wiesen in der Eule hinter Loschwitz; bey Moritzburg u. s. w. gemein.

589. P. Sylvatica, *Wald-Läusekraut.*

⊙ Juny—Septbr.

Hat mit vorigem gleichen Standort.

Classis XV.

Tetradynamia, *Viermächtige.*

Siliculosa, *mit Schötchen.*

Draba.

590. D. verna, *Hunger-Blümchen.* Auf ⊙ März—May. Aeckern, Brachen und an Wegen.

Isatis.

591. I. tinctoria, *Färber-Waid.* In den ♂ Juny. Festungswerken zwischen dem weissen und schwarzen Thore; unter Kötzschenbroda, in Weinbergen am hohen Ufer und sonst an der Elbe hin und wieder; sparsam.

Biscutella.

592. B. laevigata, *Doppeltschild, Glatte* 24 Juny, July. *Brillenschote.* Ueber dem Linkschen Bade auf der sandigen Anhöhe an der Elbe, und vor Blasewitz an der Elbe, im Flugsande nach dem Kieferbüschgen zu.

Lunaria.

593. L. rediviva, *Mond-Viole, Flitttern, Silberblatt.* Im Plauenſchen Grunde über der Neumühle bey dem Wehre, auf der waldigen und ſteinigen Anhöhe die nach Kotchütz hinauf führt; auch Hainsbach gerade über im ſchattigen Gebüſche an Felſen; im Ottowalder Grunde; im Maxner Grunde bey dem Schieferbruche und im Grunde von Hohnſtein nach Schandau.

24 Juny.

Myagrum.

594. M. Sativum, *Gemeiner Leindotter.* Auf Aeckern hin und wieder.

⊙ Mai-- July.

595. M. paniculatum, *Riſpenblüthiger Leindotter.* Auf Aeckern unter der Saat mit vorigem nicht ſelten.

⊙ Juny. July.

Iberis.

596. I. nudicaulis, *Sand-Kreſſe, nackt-ſtieliger Bauernſenf.* Auf ſandigen Aeckern, Brachen und in der Dresdner Heide; gemein.

⊙ May-- Auguſt.

Alyssum.

597. A. incanum, *Bestäubtes oder Graues*
♂ f. 24 July-- Septbr. *Steinkraut.* Vor dem weissen und schwarzen Thore auf Feldrändern und an Wegen; gemein.

598. A. calycinum, *Kelchfrüchtiges*
⊙ May-- August. *Steinkraut.* Im Plauenschen Grunde auf dürren Anhöhen; auf Mauern und an der Elbe; gemein.

Cochlearia.

599. C. Armoracia, *Meerrettig, Kreen.*
Offic. Armoraciae rad. rec. Im Stadtgraben unter dem Pirnaischen und Seethore; an der
24 Juny, July. Elbe zuweilen.

600. C. draba, *Doldentragendes* oder
24 Juny. *Stielumfassendes Löffelkraut.* Vor dem Dohnaischen Schlage im Schanzgraben zur linken Hand am Wege; vor dem Priesnitzer Schlage bey dem Pulvermagazine nach Cotta zu.

Lepidium.

601. L. ruderale, *Stink-Kreſſe.* An Mau-
⊙ May, Juny. ern und Wegen allenthalben.

602. L. ſativum, *Garten Kreſſe.* Im klei-
Offic. Naſturtii hortenſis hb. ſem. nen Gehäge an der Weiſeritz un-
⊙ May-- July. ter und über der Oſtrabrücke; ſparſam.

Thlaſpi.

603. T. arvenſe, *Acker-Täſchelkraut.* Auf
Offic. Thlaſpeos ſem. Aeckern gemein.
⊙ May, Juny.

604. T. campeſtre, *Feld-Täſchelkraut.*
♂ May, Juny. Am Weiſeritzufer ohnweit der Oſtrabrücke; auf Aeckern bey Koſchütz, Birkwitz und Pratſchwitz an der Elbe u. ſ. w.

605. T. montanum, *Berg-Täſchelkraut.*
♃ April, May. Im Zſchoner Grunde und ſonſt im ſchattigen Laubholze gemein.

606. T. praecox, *Frühes Täſchelkraut.*
♃ April, May. An der Boſel bey Sörnewitz und anderwärts.

607. T. bursa pastoris, *Hirten-Täschel-kraut.* Auf Aeckern und Brachen allenthalben.
Offic. Bursae pastoris hb. ⊙ April-- Septbr.

Siliquosa, *mit Schoten.*

Raphanus.

608. R. Raphanistrum, *Hederich.* Unter der Saat, vorzüglich in der Gerste.
⊙ May-- August.

Erysimum.

609. E. officinale, *Wegsenf, Arzney-Hederich.* An Gräben und Wegen allenthalben.
Offic. Erysimi hb tem. ⊙ Juny-- August

610. E. Barbarea, *Stumpfblättriger Hederich.* Im Plauenschen Grunde; im grosen Garten und an der Strehlischen Bach; häufig.
♃ May, Juny.

611. E. Alliaria, *Knoblauchduftiger Hederich.* Im Plauenschen Grunde und sonst an feuchten schattigen Orten gemein.
Offic. Alliariae hb. ♂ f. ♃ May, Juny.

612. E. cheiranthoides, *Leucojenartiger Hederich.* An der Elbe und an allen Orten.
⊙ Juny-- Septbr.

613. E. hieracifolium, *Habichtskraut-*
♂ May, Juny. *blättriger Hederich.* Auf dem Gräfl. Brühlschen Garten unter der Barriere; ferner unter der Ostrabrücke; auf Aeckern bey Neudorf, Pieschen und anderwärts.

Cheiranthus.

614. C. Erysimoides, *Hederichartige*
♂ May, Juny. *Leucoje.* Hinter dem neuen Anbau auf der sandigen Brache bis zum Priesnitzbache hin; sehr sparsam.

Arabis.

615. A. thaliana, *Thalisches Gänsekraut.*
⊙ April, May. Auf Aeckern und Brachen.

616. A. Halleri, *Hallersches Gänsekraut.*
♂ May, Juny. Hinter dem Michaelischen Weinberge in einer kleinen Schlucht; im Loschwitzer Grunde und in der Eule auf den grasigen Anhöhen zur rechten Hand; desgleiim Rheinhardsgrimmschen Grunde gleich hinter der Teufelsmühle am Wege und an mehrern Orten.

Braſſica.

617. B. Napus, *Rübſen-Kohl.* Unter der Saat und ſonſt auf Aeckern hin und wieder.
Offic. Napi Semina.
♂ May, Juny.

Turritis.

618. T. glabra, *Glattes Thurmkraut.* Im Plauenſchen Grunde an Felſen und ſonſt nicht ſelten.
♂ May, Juny.

619. T. hirſuta, *Rauches Thurmkraut.* In den Feſtungswerken vor dem Falken- Dippoldiswaldaer und Pirnaiſchen Schlage und anderwärts.
♂ May, Juny.

Cardamine.

620. C. impatiens, *Spring-Cardamine.* Am Weiſeritzmühlgraben innerhalb des Falkenſchlages bey dem Kirchhofe; im Plauenſchen Grunde zwiſchen der Neu- und Pulvermühle jenſeits der Weiſeritz im ſchattigen und ſteinigen Gebüſche; zwiſchen Gieſshübel und Gottleube im Poetengange; ſehr ſelten.
♂ May, Juny.

621. C. pratensis, *Wiesen-Cardamine.*
Offic. Nasturtii pratensis s. Cardamines hb. flor.
24 April. May, Auf Wiesen gemein.

622. C. amara, *Bittere Cardamine.* Auf
24 May. Juny, nassen Wiesen und an Bächen und Quellen.

623. C. hirsuta, *Behaarte Cardamine.*
⊙ May, Juny. Am Loschwitzer Elbwege, wo die Quelle aus der Weinbergsmauer fliesst; an der Weiseritz im kleinen Gehäge; ist aber äusserst sparsam und selten vorhanden.

Sinapis.

624. S. arvensis, *Acker-Senf.* Auf Aek-
⊙ Juny, July. kern des Churfürstl. Vorwerks; bey Cotta und anderwärts.

Sisymbrium.

625. S. Nasturtium, *Brunnenkresse, Quellen-Rauke.* Im Bache zwischen dem Schusterhäuschen und Cot-
Offic. Nasturtii aquatici hb.
24 May, Juny, ta; bey Cotta und Lübtau; desgleichen bey dem Mockeritzer Teiche in Gräben und im Moraste.

626. S. ſylveſtre, *Wilde Rauke.* An Grä-
24 Juny--Auguſt. ben, Wegen und an der Elbe allenthalben.

627. S. amphybium, *Waſſer-Rauke.*
24 Juny, July. a) S. terreſtre. An der Elbe gemein.
b) S. aquaticum. An der Weiſeritz und Elbe in feuchten Gräben; auf dem Serkewitzer Heger und anderwärts.

628. S. paluſtre, *Sumpf-Rauke.* An der
⊙ Juny--Auguſt. Elbe in feuchten Gräben und auf dem Serkewitzer Heger.

629. S. arenoſum, *Sand-Rauke.* Auf
⊙ May. Juny, der Feſtung Sonnenſtein an den Mauern; in Poſte an der Elbe und im Ottowalder und Schandauer Grunde; im Hoflösnitz-Grunde am Sandberge zur linken Hand; auf der Boſel an den Felſenabhängen nach der Straſse zu.

630. S Sophia, *Feinblättrige Rauke.*
Offic. Sophiae Chirurgorum femina.
⊙ May-- July.
Auf Mauern, Gemäuere und an Wegen hin und wieder.

631. S. Loefelii, *Löfels Rauke.* Am
⊙ May-- July.
Zwingerwalle wo man die Appareille hinauf gehet; vor dem weissen und schwarzen Thore, und sonst nicht selten.

Classis XVI.

Monadelphia, *Einbrüdrige.*

Decandria, *Zehnmännige.*

Geranium.

632. G. cicutarium,*) (Erodium cicutarium,) *Schierlingsblättriger Storchschnabel.* Auf Aekkern gemein.
⊙ May--August.

633. G. palustre, *Sumpf-Storchschnabel.* An Bächen und auf feuchten Wiesen im Gesträuche allenthalben.
♃ July--August.

634. G. pratense, *Wiesen-Storchschnabel.* Auf Elbwiesen gemein.
♃ July, July.

635. G. robertianum, *Stinkender Storchschnabel, Ruprechtskraut.* In feuchten felsigen Waldungen; im Pillnitzer Friedrichsthale u. s. w.
Offic Geranii robertiani hb. ⊙ May, July.

*) Dieses Geranium zeichnet sich vor den übrigen hier aufgeführten Arten dadurch aus, dass es nur fünf Staubfäden hat; daher es auch von WILLDENOW unter das zu den Pentandris dieser Klasse gehörige Geschlecht des Erodii versetzt worden ist,

636. G. molle, *Weicher Storchſchnabel.*
⊙ Juny, July. Auf Aeckern und an Mauern; in den Loſchwitzer Weinbergsgaſſen.

637. G. columbinum, *Taubenſchnabel, Feintheiliger Storchſchnabel.*
⊙ July, Auguſt. Im Plauenſchen Grunde über dem Eiſenhammer zur rechten Hand im Gebüſche, desgleichen im Zſchoner Grunde.

638. G. diſſectum, *Schlitzblättriger Storchſchnabel.* Auf Aeckern nach der Aerndte nicht ſelten.
⊙ Juny-- Auguſt.

639. G. puſillum, *Niedriger Storchſchnabel.* Hat mit vorigem gleichen Standort; gemein.
⊙ July. Auguſt.

640. G. Suanguineum, *Blutrother Storchſchnabel.* Auf den Loſchwitzer Weinbergsanhöhen in Gaſſen an Hecken hin und wieder; im Hoflösnitzgrunde ſparſam.
24 May-- July.

Polyandria, *Vielmännige.*

Malva.

641. M. rotundifolia, *Rundblättrige Malve.* An Mauern und Wegen gemein.

Offic. Malvae vulgaris rad. hb. flor. semina.

♃ Juny--August.

642. M. Sylvestris, *Wald-Malve, Wilde Pappel.* Auf Aeckern; an Hecken und Zäunen mit vorigem in Gesellschaft.

Offic. Malvae sylvestris hb. flor.

☌ July, August.

643. M. Alcea, *Schlitzblättrige Malve.* Bey Potschappel zur rechten Hand am Gesträuche; am Fusssteige über die Wiesen von Pillnitz nach Oberboiritz; auf den Dämmen der sogenannten Nasse; desgleichen vor Gröbern im Gesträuche und anderwärts.

Offic. Alceae rad.

♃ July--Septbr.

Classis XVII.

Diadelphia, *Zweybrüdrige.*

Hexandria, *Sechsmännige.*

Fumaria.

644. F. cava, (bulbosa,) *Hohlwurzlicher Erdrauch.* Im Plauenschen Grunde vor und unter Koschütz, häufig.
Offic. Aristolochiae fabaceae rad. ♃ April, May.

645. F. lutea, *Gelber Erdrauch.* Auf dem Gräflich Brühlschen Garten bey dem Treibhause zwischen den Mauern der Kasematten; auch hinter dem Gouvernements-Palais an einem ähnlichen Orte.
♃ Juny—August.

946. F. officinalis, *Gemeiner Erdrauch.* Auf fruchtbaren Aeckern; in Weinbergen und Gärten gemein.
Offic. Fumariae hb. ☉ May, Juny.

Octandria, *Achtmännige.*

Polygala.

647. P. vulgaris, *Gemeine Polygala.* Auf Wiesen allenthalben.

Offic. Polygalae vulgaris hb. rad.

♃ Mai-- July.

Decandria, *Zehnmännige.*

Spartium.

648. S. Scoparium, *Gemeine Pfriemen.* *Rehheide.* Bey dem Mordgrunde und bey Wachwitz; bey Jessen, Bonnewitz, Graupe, Liebethal; auf den Anhöhen bey Niederwartha u. s. w.

Offic. Spartii Scoparii flor. hb. semina.

♄ May, Juny.

Genista.

649. G. tinctoria; *Färber-Ginster.* In Thälern und Gründen, auf Anhöhen allenthalben.

♄ Juny, July.

650. G. pilosa, *Haariger Ginster.* Im Moritzburger Thiergarten und in der Dresdner Heide, sparsam; hinter Weisig auf buschigen Anhöhen.

♄ Juny, July.

651. G. germanica, *Deutſcher Ginſter.*
♄ Juny, July. Hat mit G. tinctoria gleichen Standort.

Anthyllis.

652. A. vulneraria, *Wund-Klee.* Auf
24 Juny--Auguſt. ſandigen Hügeln und an Buſchrändern; im Radebeuler und andern ſandigen Gehölze.

Ononis.

653. O. arvenſis, (O. hircina,) *Acker-*
Offic. Ononidis rad. hb. *oder Stinkende Hauhechel.* Auf
24 Juny--Septbr. trocknen Hügeln, Feldrändern und an Wegen gemein.

654. O. Spinoſa, *Stachliche Hauhechel.*
24 July--Septbr. Blühet mit vorigem in Geſellſchaft.

Orobus.

655. O. vernus, *Frühlings-Walderbſe.*
24 April, May. Im Plauenſchen- Zſchoner- und Conſtappler Grunde; auf buſchigen Anhöhen allenthalben.

656. O. tuberoſus, *Knollige Walderbſe.*
24 May. Mit vorigem in Geſellſchaft.

657. O. niger, *Schwarze Walderbſe.* Mit
24 Juny, July. vorigen an denſelben Orten.

658. O. tenuifolius, *Dünnblättrige*
24 May, Juny. *Walderbſe.* Ebendaſelbſt.

Lathyrus.

659. L. tuberoſus, *Knollige Platterbſe.*
24 May, Juny. Auf fruchtbaren Aeckern unter der Saat, beſonders auf den Niederauer Fluren und bey Gröbern.

660. L. pratenſis, *Gelbe Wieſen-Platt-*
24 Juny, July. *erbſe.* An Hecken, Zäunen und auf Wieſen.

661. L. paluſtris, *Sumpf-Platterbſe.* Bey
24 Juny, July. dem Liegauer Bade im moraſtigen Gebüſche; aber ſehr ſelten.

662. L. latifolius, *Breitblättrige Platt-*
24 Juny, July. *erbſe.* Im Plauenſchen Grunde auf waldigen Anhöhen, ſehr ſparſam; auf der zweyten buſchigen Anhöhe hinter Weiſsig.

663. L. sylvestris, *Wald-Platterbse.* Im
24 Juny—August. Plauenschen Grunde bey dem Eisenhammer; im Seyfersdorfer Thale auf Anhöhen; auf den Weisiger Bergen; auf dem Groscottaer- und Wilschberge; im Constappler Thale auf buschigen Anhöhen zur rechten Hand und anderwärts.

Vicia.

664. V. pisiformis, *Erbsenartige Wicke.*
24 Juny, July. Auf dem Windberge gegen Westen, hinter der Loschwitzer Presse auf den waldigen Anhöhen; sehr selten.

665. V. dumetorum, *Hecken-Wicke.*
24 Juny, July. Vor Wildberg im Haselbusche zur linken Hand; an der Elbe zwischen Posta und Städtlein Wehlen auf der buschigen Anhöhe; bey Constappel im Prinzengrunde und bey Dohna im Bloschwitzer Laubholze; sparsam.

666. V. sylvatica, *Wald-Wicke.* Im
24 Juny, July. Zschoner Grunde vor der Mühle linker Hand im Gebüsche, und sonst mit vorigem nicht selten.

667. V. Cracca, *Vogel-Wicke.* Auf den
24 Juny, July, Remisen und auf fruchtbaren Aekkern und Wiesen gemein.

668. V. multiflora, (V. cassubica,)
24 Juny - August. *Vielbluthige Wicke.* Vor Dürrebiehle am Steinbruche, zu dem ein von der Meilensäule rechter Hand abweichender Fussteig hinführt; auf den Weissiger Hügeln; im Hoflösnitzgrunde auf Anhöhen und in Weinbergen; zwischen Loschwitz und der Presse, auf buschigen Anhöhen hinter den Weinbergen und in den Bergschluchten daselbst; häufig.

669. V. Sativa, *Futter-Wicke.* Im Ge-
⊙ Juny, July. treide.

670. V. anguſtifolia, *Schmalblättrige Wicke.* Blühet mit vorigem in Geſellſchaft; auch auf graſigen Hügeln hin und wieder.
⊙ Juny. July.

671. V. lathyroides, *Frühlings-Wicke.* Auf trockenen Hügeln gemein.
⊙ April, May.

672. V. Sepium, *Zaun-Wicke.* An Hekken und Zäunen; bey den Remiſen im Geſträuche und anderwärts.
♃ May. Juny.

Aſtragalus.

673. A. glycyphyllos, *Wildes Süſsholz, Süſsholzblättriger Traganth.* Im Plauenſchen Grunde bey Koſchütz und dem Eiſenhammer im Gebüſche; auf dem Wiliſchberge gegen Mittag ſehr häufig, und ſonſt im Laubholze nicht ſelten.
♃ Juny. July.

Trifolium.

674. T. melilotus officinalis, *Stein-*
Offic. Melilloti citrini et albi hb. Summitates, flores.
♂ July - Septbr.
oder *Meloten-Klee.* Auf Aekkern vor Gamig, vor Gröbern, und an der Elbe hin und wieder.

β. T. melil. offic. flore albo. Blühet mit vorigem in Gesellschaft.

675. T. hybridum, *Bastard-Klee.* Auf
24 Juny-- August.
nassen Wiesen bey Cotta, Unsewitz, Radebeul und anderwärts.

676. T. repens, *Weisser* oder *Kriechender*
Offic. Trifolii albi flor.
Klee. Auf Angern und Weiden
24 May-- August.
gemein.

677. T. pratense, *Wiesen-Klee.* Auf Elb-
24 Juny-- August.
und andern fruchtbaren Wiesen.

678. T. alpestre, *Alpen-Klee, Rother*
24 Juny, July.
Bergklee. Im Plauenschen, Zschoner und Lockwitzer Grunde auf Anhöhen.

679. T. flexuoſum, (T. medium,) *Gebogener* oder *Mittlerer Klee.* Im Zſchoner Grunde über dem Bergwerke mit T. alpeſtre.
♃ Juny, July.

680. T. arvenſe, *Acker-Klee.* Auf Aeckern und Brachen.
☉ July, Auguſt

681. T. montanum, *Weiſſer Bergklee.* Im Plauenſchen, Zſchoner- und Lockwitzer Grunde auf buſchigen Anhöhen und anderwärts; auf Gebirgswieſen.
♃ Juny-- Auguſt.

682. T. agrarium, (T. aureum,) *Goldgelber Klee.* Blühet mit vorigem; vorzüglich an den ſteilen Felſenabhängen über der Krähenhütte und bey Potſchappel auf einem Wieſendamme.
☉ July-- Septbr,

683. T. ſpadiceum, *Brauner Klee.* Auf der grafigen Anhöhe bey dem Egelſee, und ſonſt auf Wieſen nicht ſelten.
☉ Juny, July.

684. T. procumbens, *Liegender Klee.*
⊙ Juny, July. Im Plauenschen Grunde hinter dem Hegereuter auf der grasigen Anhöhe in Gesellschaft mit Medicago minima, und auf Aekkern und Brachen gemein.

685. T. Filiforme, *Fadenförmiger Klee.*
⊙ July, August. Auf Aeckern, Wiesen und trokkenen Hügeln hin und wieder.

Hedysarum.

686. H. Onobrychis, *Esparsette.* Auf
24 Juny, July. den Elbwiesen bey dem Garnison-Lagarethe und Linkschen Bade; sparsam.

Coronilla.

687. C. varia, *Bunte Peltschen, Kron-Wicke.* Auf Elbwiesen und an
⊙ July, August. Hecken und Zäunen.

Ornithopus.

688. O. perpusillus, *Kleiner* oder *Liegender Vogelfuss.* Auf sandigen Aeckern, Brachen und in
⊙ Juny, July. der Dresdner Heide; nicht selten.

Medicago.

689. M. falcata, *Sichelfrüchtiger Schnek-*
♃ Juny, July. *kenklee.* Auf Wiesen und grasi-
gen Anhöhen gemein.

690. M. lupulina, *Hopfenartiger Schnek-*
♂ Juny, July. *kenklee.* Auf der grasigen An-
höhe hinter dem Plauenschen He-
gereuter in Gesellschaft mit M.
minima und T. procum-
bens; auf Wiesen und Brachen.

691. M. sativa, *Luzerner- Schneckenklee.*
♃ Juny, July. Auf Elbwiesen, und in den innern
und äussern Festungswerken am
weissen und schwarzen Thore.

692, M. minima. *Kleinster Schneckenklee.*
⊙ May, Juny. Auf grasigen Anhöhen im Plau-
enschen Grunde; auf sandigen
Brachen hinter dem neuen An-
bau; desgleichen auch bey Hopf-
gartens.

Ervum.

693. E. hirsutum, *Behaarte Erve.* Auf
⊙ Juny, July. Aeckern, Wiesen und an Zäunen.

Cytisus.

694. C. nigricans, *Schwärzlicher Bohnenbaum.* An der Elbe bey dem Mordgrunde, auf der Anhöhe; im Seyfersdorfer Thale an Felsen; im Plauenschen- Zschoner- und Constappler Grunde auf Anhöhen.

♄ July, August.

Lotus.

695. L. corniculata, *Gehörnter Schotenklee, Hornklee.*

24 Juny, July.

Var. a) sylvatica. Auf buschigen Anhöhen.

b) arvensis. Auf Brachen und Wiesen.

c) tenuifolia. Auf den Nassen und den Niederauer Wiesen u. s. w.

Classis XVIII.

Polyadelphia, *Vielbrüdrige.*

Polyandria, *Vielmännige.*

Hypericum.

696. H. quadrangulare, *Vierkantiges Hartheu.* In Cotta, Volkersdorf und Bernsdorf an kleinen Bachen, und anderwärts.
24 July, August.

697. H. perforatum, *Durchlöchertes Hartheu, Johanniskraut.* Blühet an allen Orten.
Offic. Hyperici hb. flor.
24 July, August.

698. H. humifusum, *Gestrecktes Hartheu, Klein Johanniskraut.* Auf sandigen Aeckern, Brachen und an Buschrändern; bey Pillnitz, Rähnis, Hermsdorf, Kunnersdorf und Seyfersdorf häufig.
24 July, August.

699. H. montanum, *Berg-Hartheu.* Im Plauenschen-Zschoner und Kostebauder Grunde auf buschigen Anhöhen.
24 July, August.

700. H. hirſutum, *Rauches Hartheu.*

24 June, July. Blühet mit vorigem in Geſellſchaft; im Gebüſche vor Koſtebauda und Niederwartha; unter Niederwartha auf der buſchigen Anhöhe zur linken Hand, mit Vinca minor und Clematis erecta u. ſ. w.

Claſſis XIX.

Syngeneſia, *Vereinigte.*

Polygamia aequalis, *Gleiche Vielehe.*

Cichorium.

701. C. Intybus, *Wilde Wegwarte, Cichorie.* An Wegen gemein; vorzüglich häufig auf den Niederauer Aeckern und Wieſen; desgleichen bey Gröbern.

Offic. Cichorii rad. flor. hb. ſemina.

♃ July, Auguſt.

Hypochoeris.

702. H. maculata, *Gefleckt Ferkelkraut,* Im Plauenſchen Grunde auf dem hohen waldigen Berge hinter dem zur Pulvermühle gehörigen Wohnhauſe, an der Mittagsſeite; am Wege von Ober-Wartha nach Hündorf, am Ende der Kirſchbaumallee vor dem Thale auf einem trockenen Hügel.

♃ Juny, July.

703. H. radicata, *Aeſtiges Ferkelkraut.* Im Plauenſchen Grunde und ſonſt auf Wieſen nicht ſelten.

♃ Juny-- Auguſt.

704. H. glabra, *Glatt Ferkelkraut.* Auf
⊙ Juny--Auguſt. Aeckern, Brachen und Wieſen; bey Radebeul, Serkewitz und anderwärts.

Leontodon.

705. L. Taraxacum, *Löwenzahn, Butterblume, Pfaffenröhrlein.* Blühet an allen Orten.
Offic. Taraxaci rad. hb.
2 April--Juny.

Apargia.

706. A. haſtilis, *Spieſsartige* oder *Glatte Apargie.* In den Loſchwitzer Weinbergsgaſſen und ſonſt nicht ſelten.
2 Juny, July.

707. A. hiſpida, *Borſtige* oder *Gabelhaarige Apargie.* Auf Wieſen allenthalben.
2 Juny--Septbr.

708. A. autumnalis, *Herbſtlöwenzahn, Herbſt-Apargie.* Blühet mit vorigen in Geſellſchaft, gemein.
2 July--Septbr.

Tragopogon.

709. T. pratenſis, *Wieſen-Bocksbart.* Auf Elbwieſen.
Offic. Barbae Hirci rad.
♂ May, Juny.

Sonchus.

710. S. arvenſis, *Acker-Gänſediſtel.* Auf
♃ Juny—August. Aeckern in der Saat und im Kraut- und Erdbirnlande.

711. S. oleraceus, *Gemüſeartige Gänſe-*
⊙ July. August. *diſtel.*

a) S. laevis laciniatus latifolius.

b) S. aſper laciniatus.

c) S. aſper non laciniatus.

Auf Aeckern bey Strehla, Leubnitz, Potſchappel und anderwärts.

712. S. alpinus, *Alpen-Gänſediſtel.* Bey
♃ July. August. Altenberg am Schwarzwaſſer, und an andern kleinen Bächen.

Scorzonera.

713. S. humilis, *Skorzonere, Niedrige*
Offic. Scorzonerae rad. *Haberwurz.* Vor Langebrück
♃ April, May. auf einer Wieſe zwiſchen dem Langebrücker und Liegauer Wege, in der Nähe der Pinguiculae vulgaris.

Crepis.

714. C. tectorum, *Dach-Pippau.* In den äuſſern Feſtungswerken und ſonſt gemein.
⊙ Juny, July.

715. C. biennis, *Zweyjähriger Pippau.* Vor dem Dohnaiſchen Schlage auf der Wieſe zur rechten Hand, und auf andern fruchtbaren Wieſen; gemein.
♂ Juny, July.

716. C. virens, (C. pinnatifida) *Grün Pippau.* Auf Wieſen zwiſchen dem Geſträuche und auf Stoppeläckern.
⊙ Auguſt. Octob.

Chondrilla.

717. C. juncea, *Binſenartige Chondrille, Sonnenwirbel.* Zwiſchen Pillnitz und Oberboiritz an den Weinbergsmauern; auf dem neuen Anbau nach dem Prieſsnitzbache zu und hinter dem Linkſchen Bade; auf der Freyberger Straſse über der ſteinern Weiſeritzbrücke an Hügeln; bey Kötitz am Elbufer, und bey Sörnewitz.
24 July, Auguſt.

Prenanthes.

718. P. purpurea, *Purpurner Haſen-* oder
24 July, August. *Wald-Lattich.* Im Ziegengrunde und im Pillnitzer Friedrichsthale bey der Weichsmühle im Gebüſche; bey Dohna im Laubholze, und im Lohmener und Ottowalder Grunde.

719. P. viminea, *Klebriger Haſenlattich.*
♂ June, July. Bey Pillnitz, ungefähr hundert Schritte über der Ruine an der niedrigen Mauer zur rechten Hand.

720. P. muralis, *Mauer-* oder *Haſen-Lattich.* Im Loſchwitzer und Hoflösnitzgrunde; auf dem Borſchberge und anderwärts.
⊙ June, July.

Lactuca.

721. L. Scariola, *Wilder Salat, Wilder*
Offic. Lactucae ſylveſtris ſ. Scariolae hb. *Lattich.* Auf den Pfeilern der Oſtrabrücke; im Plauenſchen Grunde an Felſen; an den Weinbergsmauern vor dem Mordgrunde; desgleichen hinter dem weiten Kirchhofe und ſonſt nicht ſelten.
⊙ July. August.

722. L. perennis, *Dauernder Salat* oder
24 June, July. *Lattich.* Am Sörnewitzer Steinbruche auf der Anhöhe mit Anthericum Liliago und Athamanta Cervaria; desgleichen auf der Boſel.

Hieracium.

723. H. piloſella, *Gelbes Mäuſeöhrlein,*
Offic. Auriculae muris ſ. Piloſellae hb. *Gemeines Habichtskraut.* Auf trockenen Hügeln gemein.
24 June-- Auguſt.

724. H. dubium, *Zweifelhaftes* oder *Glattes Habichtskraut.* Blühet mit vorigem in Geſellſchaft.
24 June-- Auguſt.

725. H. Auricula, *Groſses Mäuſeohr,*
24 May-- July. *Triften-Habichtskraut.* Auf Ackerrändern und Wieſen; in den Gräben auſſerhalb Prinz Antons Garten und anderwärts; ſparſam.

726. H. cymoſum, *Vielblumiges Habichtskraut.* Blühet in Geſellſchaft mit vorigem hin und wieder.
24 May-- July.

727. H. praemorſum, *Traubiges Habichtskraut.* Vor Zaſchendorf wenn man von Sörnewitz kommt, an den Weinbergen und auf dem grafigen Hügel hinter der niedrigen Mauer zur rechten Hand, mit Valeriana offic. Clematis erecta und Athamanta Oreoſelinum.
24 July, July.

728. H. murorum, *Mauer-Habichtskraut, Gelb Lungenkraut.* Im Gebüſche und in Waldungen.
24 May-- Auguſt.

729. H. Sabaudum, *Savoyiſches Habichtskraut.* Im Planenſchen Grunde auf buſchigen Anhöhen; im Mordgrunde und ſonſt gemein.
24 July, Auguſt.

730. H. umbellatum, *Doldenblumiges Habichtskraut.* Auf Wieſen bey Birkwitz, Rähnis, Moritzburg und im Gebüſche allenthalben.
24 July. Auguſt.

731. H. paludoſum, *Sumpf-Habichts-kraut.* Im Plauenſchen Grunde in der Schlucht hinter dem Waſſerpalais und im Kaitzer Thale am Bache.
24 July.

Lapſana.

732. L. communis, *Gemeiner Rainkohl.* Auf Aeckern und ſonſt gemein.
⊙ Juny-- Auguſt.

Hyoſeris.

733. H. minima, (Lapſana puſilla,) *Kleiner Schweinesallat, kleiner Rainkohl.* Auf Aeckern bey Dürre-Biehla, Weiſsig, Radebeul, Kötzſchenbroda, Naundorf, Brockwitz u. ſ. w.
⊙ July, Auguſt.

Carlina.

734. C. vulgaris, *Dreydiſtel, Gemeine Eberwurz.* Auf unfruchtbaren Anhöhen und trockenen Hügeln.
♂ July, Auguſt.

Carduus.

735. C. nutans, *Biſam-Diſtel, Hangende Diſtel.* An Wegen und ſonſt allenthalben.
♂ July. Auguſt

736. C. criſpus, *Krauſe Diſtel.* Blühet
⊙ Juny-- Auguſt. mit vorigem in Geſellſchaft.

737. C. acanthoides, *Krebsdiſtelartige*
⊙♂ Juny-- Auguſt. *Diſtel, Wege - Diſtel.* Im feuchten ſchattigen Gebüſche und an Hecken und Zäunen.

738. C. marianus, *Marien-Diſtel.* Hin-
Offic. Cardui Mariae ſemina. ter Hopfgartens und dem weiten Kirchhofe gerade über am Fahr-
⊙♂ July, Auguſt. wege nach dem Elbholze, auf altem Gemäuer; aber ſehr ſelten.

Cnicus.

739. C. oleraceus, *Gemüſeartiges Kratz-*
♃ July. Auguſt. *kraut, Wieſenkohl.* Am Strehliſchen Bache; auf Wieſen bey Cotta und anderwärts; häufig.

740. C. lanceolatus, *Lanzenblättriges*
♂ July, Auguſt. *Kratzkraut.* An Wegen, auf Angern und ſonſt gemein.

741. C. paluſtris, *Sumpf-Kratzkraut.*
♃ July, Auguſt. Auf naſſen Wieſen bey Döhlen, Lauſa, Schönborn u. ſ. w.

742. C. canus, *Graues Kratzkraut.* Ueber
♃ August, Septbr. Nieder-Sedlitz am Dorfe Klein-Luga auf einer naſſen Wieſe häufig.

743. C. tuberoſus, *Knolliges Kratzkraut.*
♃ July-- Septbr. Bey der zweyten Remiſe am Buſchrande im Graſe, ſparſam; auf den Naſſeu.

744. C. eriophorus, *Wollköpfiges Kratz-*
♂ July, August. *kraut.* Im Plauenſchen Grunde zwiſchen Koſchütz und der Pulvermühle auf Anhöhen; im Kaitzer Thale; ſehr ſelten.

745. C. heterophyllus, *Berg-Diſtel,*
♃ July. August, *Verſchiedenblättriges Kratz-kraut.* Bey Lauenſtein, Bärenſtein, Geiſing und Altenberg auf Wieſen häufig.

746. C. acaulis, *Stielloſes. Kratzkraut.*
24 July--Septbr. Am Eingange in den Plauenſchen Grund jenſeits der Weiſeritz auf der Anhöhe; auf den Naſſen und unter Gröbern; zwiſchen Brockwitz und Weinböhla im Nadelholze bey dem Oberauer Kalkofen; am Fuſſe des Wilſchberges mit C. dubius und anderwärts.

747. C. dubius, *) *Zweifelhaftes Kratzkraut.*
24 July--Septbr. Auf den Naſſen hin und wieder; am Wilſchberge gegen Mittag mit vorigem zwiſchen Wachholder Sträuchen; ſparſam.

Arctium.

748. A. Lappa, *Gemeine Klette.* An Hek-
Offic. Bardanae rad. hb. femina. ken, Zäunen und Wegen.
♂ July--Septbr.

*) Card. dubius iſt nach WILLD. blos Var. C. acaulis.

Onopordum.

749. O. Acanthium, *Groſse Wegdiſtel, Krebsdiſtel.* Vor dem ſchwarzen, weiſſen und äuſſern Pirnaiſchen Thore an Gräben und Wegen.

Offic. Acanthii vulgaris hb. recens.

♂ July, Auguſt.

Serratula.

750. S. tinctoria, *Färber-Scharte.* Im Plauenſchen Grunde auf buſchigen Anhöhen; auf den Niederauer Wieſen ſehr häufig.

24 July, Auguſt.

751. S. arvenſis, *Acker-Scharte, Haber-Diſtel.* Auf Aeckern vorzüglich in dem Haber.

♂ July, Auguſt.

Eupatorium.

752. E. cannabinum, *Alpkraut, Hanfartiger Waſſerdoſt.* An der Elbe unter dem Prieſsnitzer Luſtgarten an Felſen; bey Müglitz am Waſſer und im Plauenſchen Grunde an der Weiſeritz hin und wieder.

Offic. Eupatorii hb.

24 July, Auguſt.

Bidens.

753. B. tripartita, *Dreytheiliger Zwey.*
⊙ Auguſt, Septbr. *zahn.* An naſſen Gräben gemein.

754. B. minima, *) *Kleinſter Zweyzahn.*
⊙ Auguſt, Septbr. Hinter Conſtappel im Prinzengrunde am Bache; an den Ufern der Teiche und andern überſchwemmten Orten.

755. B. cernua, *Nickender Zweyzahn.* In
⊙ Auguſt. Septbr. Dörfern an Gräben; in Cotta und anderwärts.

Polygamia ſuperflua, *Uebrige Vielehe.*

Artemiſia.

756. A. campeſtris, *Feld-Beyfuſs.* Auf
2ℓ Auguſt, Septbr. Brachen und trockenen unfruchtbaren Hügeln gemein.

*) Bidens minima und Coreopſis Bidens ſind nach WILLDENOW nur Unterarten von B. cernua.

757. A. Abſinthium, *Gemeiner Wermuth, Bitterer Beyfuſs.* Bey der Zwingerbrücke an der Wallmauer; desgleichen auf dem Gräfl. Brühlſchen Garten unter der Baluſtrade; im Plauenſchen Grunde an Felſen hin und wieder; unter dem Prieſsnitzer Luſtgarten an Felſen; in Mühlsdorf bey Lohmen häufig, und in mehrern Dörfern.

Offic. Abſinthii hb.

24 July, Auguſt.

758. A. vulgaris, *Gemeiner Beyfuſs.* Hat mit vorigem gleichen Standort; gemein.

Offic. Artemiſiae rubrae et albae hb.

24 July, Auguſt.

Tanacetum.

759. T. vulgare, *Gemeiner Rainfarn.* Auf Wieſen und Feldrändern.

Offic. Tanaceti hb. flor. ſemina.

24 July, Auguſt.

Conyza.

760. C. Squarroſa, *Sparrige Dürrwurz.*

♂ 24 July. Auguſt. Im Plauenſchen Grunde zur rechten Hand an Felſen und vor Tharand; auf dem Wilſchberge; im Hoflösnitz- und Seyfersdorfer Thale auf Anhöhen, und an mehrern Orten.

Gnaphalium.

761. G. arenarium, *Sand-Ruhrkraut.*

Offic. Stoechadis citrinae flor. 24 July, Auguſt. Auf ſandigen Brachen; Im Tolkewitzer und Zſchachwitzer Büſchgen; gemein.

762. G. dioicum, *Zweyhäuſiges Ruhrkraut, Katzenpfötchen.*

Offic. Gnaphalii flor. 24 May. Juny. Im Plauenſchen Grunde auf Anhöhen und ſonſt auf unfruchtbaren Hügeln.

763. G. luteo-album, *Gelblichweiſſes Ruhrkraut.*

⊙ July-- Septbr. Bey der ſogenannten breternen Saloppe an der Weinbergsmauer, ſparſam; am ſandigen Ufer des obern Waldteiches hinter Volkersdorf, am Neuteiche hinter Dippelsdorf, und an mehrern vorzüglich abgelaſſenen Teichen.

764. G. sylvaticum, (G. rectum,) *Wald-Ruhrkraut.* Auf buschigen Anhöhen und in Waldungen gemein.
♃ July-- Septbr.

765. G. uliginosum, (tomentosum,) *Sumpf-Ruhrkraut.* An feuchten Ackerrändern nicht selten.
☉ July. August.

Bellis.

766. B. perennis, *Masliebe, Gänseblümchen.* Auf Angern und Wiesen.
Offic. Bellidis minoris flores. ♃ Jan. -- Decbr.

Matricaria.

767. M. parthenium, (Pyrethrum Parthenium,) *Gemeines Mutterkraut, Mettrich.* An Gartenzäunen und Dorfmauern; in Cotta, Grünberg, Seyfersdorf; vor Tharand mit Conyza Squarrosa und anderwärts
Offic. Matricariae hb. flor. ♃ July. August.

768. M. Chamomilla, *Kamille.* Auf fruchtbaren Aeckern sehr häufig.
Offic. Chamomillae nostratis hb. flores. ☉ Juny-- August.

Chryſanthemum.

769. C. Leucanthemum, *Groſse Gänſeblume, Weiſſe Wucherblume.* Auf Wieſen und Brachen gemein.
♃ Juny, July.

770. C. inodorum, (Pyrethrum inodorum,) *Geruchloſe Wucherblume.* Auf Aeckern allenthalben.
⊙ Juny, July.

771. C. corymboſum, (Pyrethrum corymboſum,) *Strauſsartige Wucherblume.* Im Plauenſchen Grunde an Felſen und auf Anhöhen; auf der Boſel, und an mehrern Orten.
♃ July, Auguſt.

Arnica.

772. A. montana, *Berg-Wolverley.* Im Plauenſchen- Zſchoner- und Kaitzer-Grunde auf Anhöhen hin und wieder; häufig auf dem Groſscottaer Berge; auf Sumpfwieſen gemein.
Offic. Arnicae montanae rad. hb. flor.
♃ Juny, July.

Inula.

773. I. pulicaria, *Floh-Alant.* An den
⊙ July--Septbr. Ufern der Teiche und an Gräben; in Cotta, Unkersdorf, Weiſstropp, Weiſsig und anderwärts.

774. I. Helenium, *Wahrer Alant.* In
Offic. Enulae ſ. Helenii rad. Seyfersdorf, Lomnitz und Dorf
♃ July--Septbr. Wehlen an Gartenzäunen.

775. I. britannica, *Brittiſcher* oder *Wieſen-Alant.* An der Elbe und
♃ July--Septbr. ſonſt ſehr häufig.

776. I. dyſenterica, *Ruhr-Alant.* Zwi-
Offic. Conizae hb. ſchen Niederau und Gröbern an
♃ July, Auguſt. einem Graben; bey Pirna an der Elbe; ſehr ſelten und ſparſam.

777. I. falicina, *Weidenblättriger Alant.*

24 July, Auguſt. Vor Pirna am Egelſee auf der grasigen Anhöhe; im Conſtappler- und dem dabey gelegenen Prinzen Thale auf Wieſen; im Zſchoner Grunde über dem Bergwerke; auf den Niederauer Wieſen und Naſſen; unter Gröbern bey den Eichen mit Athamanta Cervaria; im Kreyſchaer Thale vor der Hummelmühle zur linken Hand auf einer einſchürigen Wieſe, wo Iris Sibirica wächſt.

Erigeron.

778. E. canadenſe, *Kanadiſches Flohkraut, Kanadiſches Berufungskraut.* Blühet allenthalben.

☉ July, Auguſt.

779. E. acre, *Scharfes Flöh-* oder *Berufungskraut.* Auf Wieſen, Brachen und dürren Hügeln hin und wieder.

24 July. Auguſt.

Solidago.

780. S. **Virgaurea**, *Gemeine Goldruthe.*
Offic. Virgae aureae hb. 24 Auguſt, Septbr. Auf buſchigen Anhöhen gemein.

Senecio.

781. S. **vulgaris**, *Gemeines Kreuzkraut.*
⊙ April-- Octbr. Auf altem Gemäuer; im Gartenlande und in Weinbergen.

782. S. **viſcoſus**, *Klebriges Kreuzkraut.*
⊙ July, Auguſt In Waldungen und ſonſt mit vorigem in Geſellſchaft allenthalben.

783. S. **ſylvaticus**, *Wald-Kreuzkraut.*
⊙ July, Auguſt. Auf dem Windberge gegen Norden; im Moritzburger Thiergarten; auf den waldigen Anhöhen zwiſchen Loſchwitz und Wachwitz.

784. S. **Jacobaea**, *Jacobs-Kreuzkraut.*
24 July, Auguſt. Auf ſteinigen Hügeln und im Gebüſche gemein.

785. S. nemorenſis, *Hain - Kreuzkraut.*
24 July, Auguſt. Unter Mobſchatz und bey Niederwartha im Laubholze; im Klein-Sedlitzer Gehölze; im Conſtappler Thale auf buſchigen Anhöhen; im Ottowalder Grunde.

786. S. Saracenicus, *Heidniſch Kreuzkraut.*
24 July, Auguſt. Bey dem Liegauer Bade; auf der Elbinſel bey Söbrigen, und ſonſt an der Elbe und Weiſeritz im Geſträuche hin und wieder. Auf dem Groſscottaer Berge.

After.

787. A. acris, *Scharfe Sternblume.* Am
24 Auguſt, Septbr. Felſenhange zwiſchen des Plauenſchen Hegereuters Wohnhaus und der Buſchmühle.

788. A. annuus. *Jährige Sternblume.* Bey
⊙ Auguſt, Septbr. der Zwingerbrücke; im Conſtappler Thale am Bache und auf den Anhöhen rechter Hand häufig; ingleichen am Ausgange des Thales, eine Viertelſtunde unter Klipphauſen auf einem Mühldamme, in Menge.

Tussilago.

789. T. farfara, *Gemeiner Huflattich.*
Offic. Farfarae s. Tussilaginis hb. rad. flores.
♃ März-- May.
Zwischen dem grossen Garten und rothen Hause in einem Graben nahe am Wege; in Cotta; am Strehlischen und am Mordgrundbache; im Kaitzer Thale; auf Aeckern bey Niederau, Gröbern und anderwärts.

790. T. hybrida, *Ross-Huflattich.* Im
♃ May.
Friedrichsthale bey Pillnitz; im Kreyschaer- Rheinhardsgrimmschen- Constappler- und Maxner Thale an Bächen.

791. T. Petasites, *Pestilenzwurz, Grossblättriger Huflattich.* Blühet
Offic. Petasitidis rad.
♃ April, May.
mit vorigem in Gesellschaft.

Anmerk. T. Petasites und T. hybrida führt WILLDENOW zusammen nur unter einer Spezies an. Erstere als ☿, durchgehends mit Zwitterblumen; letztere als ♀, mit verlängertem Strausse, Blumenstielen mit vielen Nebenblättern, und häufigen nackten weiblichen Blumen.

Anthemis.

792. A. arvenſis, *Falſche* oder *Geruchloſe*
⊙ ♂ Juny, July. *Kamille.* Auf Aeckern.

793. A. tinctoria, *Färber-Kamille.* Im
24 July, Auguſt. Plauenſchen Grunde zur rechten Hand an Felſen; im Seyfersdorfer- und Conſtappler Thale; auf der Boſel bey Sörnewitz und anderwärts.

Achillea.

794. A. Ptarmica, *Deutſcher Bertram,*
Offic. Ptarmicae rad. flor. hb. *Sumpf-Garbe.* Auf Wieſen und am Geſträuche gemein.
24 Juny, July.

795. A. Millefolium, *Schaf-Garbe.* Blü-
Offic. Millefolii hb. flor. het an allen Orten.
24 July--Septbr.

796. A. nobilis, *Edele Garbe.* In Mücken
24 July. Auguſt. und Uebigau, und am Wege nach Kaditz; zwiſchen Kötzſchenbroda und Koetitz an der Elbe.

Polygamia fruſtranea, *Vergebliche Vielehe.*

Centaurea.

797. C. phrygia, *Phrygiſche Flockenblume.* Bey Somsdorf, Gieſshübel, Gottleube, Bärenſtein, Lauenſtein, Geiſing und Altenberg auf Wieſen.
♃ July. August.

798. C. Cyanus, *Kornblume, Korn-Flokkenblume.* Auf Aeckern unter der Saat.
Offic. Cyani flores.
⊙ July. July.

799. C. paniculata, *Riſpenartige Flockenblume.* Auf der innern Freyberger Straſse auf der hohen Mauer zur rechten Hand; am hohen Ufer der Elbe bey Pieſchen und Mücken; über der Bautzner Chauſſée-Einnahme rechts im Nadelholze.
⊙ August.

800. C. Scabioſa, *Scabioſenartige Flokkenblume.* Auf Wieſen und Brachen.
♃ July. Septbr.

801. C. Jacea, *Gemeine Flockenblume.* Auf Wieſen und ſonſt gemein.
♃ July. Septbr.

802. C. Calcitrapa, *Wegsterndistel, Calcitrapen-Flockenblume.* ⊙ August, Septbr. Vor dem Pirnaischen Schlage an der Strasse, zur linken Hand.

Coreopsis.

803. C. Bidens, *Europäische Coreopsis.* ⊙ August, Septbr. In Dörfern an Gräben mit Bidens cernua und B. tripartita hin und wieder.

Polygamia necessaria, *Nöthige Vielehe.*

Filago.

804. F. germanica, (Gnaphalium germanicum,) *Deutsches Ruhrkraut, Filzkraut.* ⊙ July. August. Im Plauenschen Grunde auf trockenen Hügeln und auf dem Borsberge mit F. montana; gemein.

805. F. montana, (G. montanum,) *Berg-Ruhrkraut.* ⊙ July. August. Im Tolkewitzer- und Blasewitzer Gehäge und in der Dresdner Heide.

806. F. arvensis, (G. arvense,) *Acker-Ruhrkraut.* ⊙ July. August. Blühet mit vorigem allenthalben.

Polygamia ſegregata, *Getrennte Vielehe.*

Echinops.

807. E. Sphaerocephalus, *Bieſenknopf,*
24 July, August. *Kugeldiſtel.* Bey Uebigau an der Elbe; In Niederau an der Pfarr-Gartenmauer, der ſteinernen Brücke gerade über; ſehr ſelten.

Monogamia, *einfache Ehe.* *)

Jaſione.

808. J. montana, *Berg-Jaſione.* Auf un-
⊙ July, August. fruchtbaren Hügeln und im Gebüſche gemein.

Viola.

809. V. paluſtris, *Sumpf-Veilchen.* Auf
24 April, May. Sumpfwieſen.

*) Bekanntlich werden Jaſione, Viola und Impatiens nach einigen neuern Botanikern den Pentandriis Monogyniis beygezählt. Da jedoch nicht jeder Pflanzenfreund ihre meiſt ſehr koſtbaren Schriften beſitzt, ſo habe ich es für das dienlichſte erachtet, hier der Ordnung des Linnäiſchen Syſtems zu folgen.

810. V. odorata, *Wohlriechendes Veilchen.* Im Plauenſchen- und Zſchoner Grunde, und anderwärts.

Offic. Violae flor. ♃ März, April.

811. V. canina, *Hunds-Veilchen.* Blühet mit vorigem allenthalben.

♃ April, May.

812. V. Tricolor, *Dreyfarbiges Veilchen, Stiefmütterchen.* Auf Aeckern und Brachen.

Offic. Jaceae f. Violae tricoloris hb. ⊙ Juny-- Octob.

813. V. arvenſis,*) *Zweyfarbiges Veilchen.* Mit vorigem in Geſellſchaft.

⊙ April-- Auguſt.

Impatiens.

814. J. Nolitangere, *Springſame, Wilde Balſamine.* Im Loſchwitzer und Zſchoner Grunde an Bächen; desgleichen im Pillnitzer Friedrichsthale und anderwärts an feuchten ſchattigen Orten.

♃ July-- Septbr.

*) Var. V. Tricoloris.

Classis XX.

Gynandria, *Weibermännige.*

Diandria, *Zweymännige.*

Orchis.

815. O. bifolia, *Zweyblättriges Knabenkraut, Ragwurz, Weisser Gückguck.* Auf buschigen Anhöhen und auf nassen Wiesen gemein. 24 Juny, July.

816. O. globosa, *Kugelähriges Knabenkraut.* Am Geisingsberge auf Wiesen häufig. 24 July.

817. O. coriophora, *Stinkendes Knabenkraut.* Auf den Remisen; auf den Moritzburger Wiesen und auf den Nassen; Am Ausgange des Kaitzer Thales unter der Schäferey auf einer kleinen freyen Anhöhe zur rechten Hand; vor Pirna am Fussteige nach Zehist und dem Egelsee, auf einer Wiese zur Rechten, und an mehrern Orten. 24 Juny.

818. O. Morio, *) *Knabenkrautweiblein,*

Offic. Salep radix.

24 May, Juny, *Triften-Ragwurz.* Im Plauenschen Grunde; bey Coſtebaude, Niederwartha, Weiſstropp und Conſtappel auf Anhöhen; desgleichen vor Radebeul auf der ſonnigen Anhöhe an der Sumpfwieſe; wie auch auf den naſſen Wieſen bey Lauſa, Hermsdorf u. ſ. w. in gröſster Menge.

*) Auch die Knollen der übrigen Ragwurz-Arten, vorzüglich der O. maſculae und O. maculatae können als Arzney die Stelle der O. Morio vertreten. Man ſammlet ſie zu der Zeit ein, wenn der Stengel welkt, wäſcht ſie im kalten Waſſer und häutet ſie; dann werden ſie mit Fäden angereihet und an der Luft oder bey gelinder Wärme getrocknet. Eine Unze Salep iſt zur Nahrung eines Menſchen auf 24 Stunden hinreichend.

819. O. maſcula, *Männliches* oder *Salep-*
24 May— July. *Knabenkraut.* Zwiſchen Rheinhardsgrimma und Luga auf Wieſen am Wege, mit O. Sambucina und Aethuſa meum; bey Dohna im Bloſchwitzer Laubholze mit Car. Collina und Ophrys ovata; bey Pirna in der Viehleite; ſparſam.

820. O. uſtulata, *Zwerg-* oder *Feinblumi-*
24 Juny. *ges Knabenkraut.* Im Lockwizzer Thale auf graſigen Anhöhen zur rechten Hand, den Mühlen gerade über mit O. morio; bey Dohna und im Maxner Grunde auf Wieſen und andern verſchiedenen Grasplätzen; ſelten und ſparſam auf den Remiſen.

821. O. latifolia. *Breitblättriges* oder
24 May, Juny. *Hohlſtieliges Knabenkraut.*
β, O. paluſtris maculata.
Auf allen naſſen und ſumpfigen Wieſen.

822. O. maculata, *Gefleckte Knabenkraut.* Blühet mit den vorigen Arten und mit O. conopsea fast überall.
24 May, Juny.

823. O. sambucina, *Holländerduftiges* oder *Gelbes Knabenkraut.* Auf den Weisiger Anhöhen im Laubholze, und zwischen Rheinhardsgrimma und Luga auf Wiesen.
24 May. Juny.

824. O. incarnata, *Fleischfarbenes Knabenkraut.* Blühet mit vorigem in Gesellschaft; aber sehr sparsam.
24 May, Juny.

825. O. conopsea, *Fliegenartiges Knabenkraut.* Auf Wiesen und grasigen Anhöhen mit O. maculata allenthalben.
24 May, Juny.

Satyrium.

826. S. viride, (Orchis viridis,)

24 Juny, July. *Grüner Stendel, Grüne Bocksgeilen.* Zwiſchen Wahnsdorf und Reichenberg auf naſſen Wieſen; ingleichen bey Lauſa auf Wieſen; ferner hinter Peſterwitz in der grafigen Schlucht die nach Potſchappel führt, wie auch am Fuſſe des Wilſchberges gegen Mittag, und auf Gebirgswieſen.

827. S. albidum, (Orchis albida,)

24 Juny-- Auguſt. *Weiſslicher Stendel.* Bey Altenberg auf Acker- und Wieſenrändern, und bey Sächſ. Zinnwald auf den unterſten Wieſen zur rechten Hand nach dem Buſche hin.

Ophrys.

828. O. Nidus avis, (Epipactis Nidus avis,) *Nackende Ragwurz, Knabenkraut, Vogelneſt.* Bey Weeſenſtein im Grunde, ungefähr $\frac{1}{4}$ Stunde hinter dem Schloſſe, linker Hand auf der waldigen Anhöhe, mit Arum maculat. und Lathraea Squamaria; im Plauenſchen Grunde auf dem Windberge gegen Norden, und in andern hohen Waldungen bisweilen; im Zehiſter Büſchgen an feuchten Orten unter den Bäumen; nicht ſelten auch zwiſchen Bärenſtein und Altenberg in feuchten Wäldern.

♃ June, July.

829. O. ovata, (Epipactis ovata,) *Eyblättrige Ragwurz, Zweyblatt.* Auf den Friedrichſtädter Remiſen im Geſträuche; vor Coſtebaude und unter Niederwartha auf buſchigen Anhöhen; im Lockwizzer- Kreyſchaer- und Rheinhardsgrimmſchen Thale in Gebüſchen zur rechten Hand.

♃ May— July.

830. O. Spiralis, (Neottia ſpiralis,)

24 July—Septbr. *Spiralförmige Ragwurz.* Auf den Anhöhen bey Ober-Rathen am linken Elbufer; am Ausgange des Kaitzer Thales unter der Schäferey, auf der nämlichen Stelle wo Orchis coriophora wächſt; desgleichen auch im Maxner Grunde auf freyen Anhöhen; ſparſam.

831. O. Loeſelii, (Malaxis Loeſelii,)

24 Juny, July. *Löſels Ragwurz.* In der ſogenannten Naſſe nahe am Ausgange derſelben gegen Zſcheila, auf torfigem Boden mit Menyanthes trifoliata, Eriophorum polyſtachion und Arundo phragmites; ſehr ſparſam.

Serapias.

832. S. latifolia; (Epipactis latifolia,)
24 July. August. *Breitblättriger Zymbel.* Hinter der Loschwitzer Presse in einer hohen Bergschlucht mit Pyrola rotundifolia et P. minor; bey Tharand in Waldungen; ferner über Kreyscha auf der Haakel vor dem Wilischberge, und in den Waldungen unter Rheinhardsgrimma im Grunde, rechter Hand; bey Dohna im Laubholze, und auf dem grosen und kleinen Winterberge.

833. S. longifolia, (Epipactis palustris,) *Langblättriger Zymbel.*
24 July. August. Bey Langebrück, Schönborn, Bernsdorf und Moritzburg auf Wiesen; hinter Volkersdorf am obern Waldteiche; desgleichen zwischen Schulwitz und Eschdorf; auf den Niederauer Wiesen und den Nassen sehr häufig.

Cypripedium.

834. C. Calceolus, *Frauenſchuh, Pfaffenſchuh.* Bey Dohna im Kirchenholze, und im benachbarten Bloſchwitzer Bauergehölze in der Nähe eines eingefallenen Kalkofens mit Serapias latifolia, Convallaria majalis und Car. recurva.

24 May. Juny.

Hexandria, *Sechsmännige.*

Ariſtolochia.

835. A. Clematitis, *Gemeine Oſterluzey.* Bey Neudorf hinter den erſten Häuſern linker Hand an einer Gartenhecke; unter der Hoflösnitz an Weinbergen und an Mauern; bey Oberboiritz desgleichen; vor dem Dorfe Mügeln an einer Mauer.

Offic. Ariſtolochiae vulgaris radix.

24 May, Juny.

Polyandria, *Vielmännige.* *)

Arum.

836. A. maculatum, *Gefleckter Aron,* Offic. Ari radix. *Zehrwurz.* In der Schlucht hinter dem Waſſerpalais unter Koſchütz; auf dem Lugaer Berge am Gipfel; hinter dem Weeſenſteiner Schloſsgarten im Grunde, linker Hand auf der waldigen Anhöhe an einer kleinen Quelle. 24 May, Juny.

Calla.

837. C. paluſtris, *Sumpf-Aron, Sumpf-Drachenwurz.* Ueber der Mordgrundbrücke in der Heide am Bache, im Moraſte; hinter Weiſsig an der Straſse im Buſche auf Sumpfwieſen rechter Hand; desgleichen vor Fiſchbach auf der Sumpfwieſe am Walde; und ſonſt in der Dresdner und Lausnitzer Heide in Sümpfen; am Zſchornaer Mühlteiche und anderwärts. 24 May, Juny.

*) Nachfolgende zwey Gattungen, als Arum und Calla, gehören nach einigen botaniſchen Schriftſtellern zu den Monoeciis Monandriis; nach andern wieder, und namentlich nach WILLDENOW, wird Arum zu den Monoeciis Polyandriis, und Calla zu den Heptandriis Monogyniis gerechnet.

Classis XXI.

Monoecia, *Einhäusige.*

Monandria, *Einmännige.*

Chara.

838. C. vulgaris, *Gemeiner Armleuchter.*

24 Juny, July. Vor Pirna im Egelsee; hinter und zwischen Ober- und Niederau in Lachen; am Ausgange der Nüssen vor Meissen in den kleinen Lachen zur linken Hand; desgleichen vor Wilschdorf in einer Lache auf den nassen Wiesen.

839. C. flexilis, *Biegsamer Armleuchter.*

24 May, Juny. Bey Zschoina im abgelassenen Grosteiche, in den stehenden Gewässern nach dem Breitenteiche zu; vor Moritzburg an der Allee zur rechten Hand in einer Lache, der Eisenberger Windmühle schief über.

Diandria, *Zweymännige.*

Lemna.

840. L. trisulca, *Dreyspitzige Wasserlinse, Entengrün.* Im grofsen Gehäge in den Lachen bey dem Pichhäuschen; hinter Brockwitz im Pfarrteiche; desgleichen hinter Zaschendorf im Wassergraben nach den Nassen zu.
24 Juny, July.

841. L. minor, *Kleine Wasserlinse.*
24 Juny,

842. L. gibba, *Buckellinse.*
24 Juny. July.

843. L. polyrhiza, *Vielwurzliche Wasserlinse.*
24 Juny.

In Lachen und andern stehenden Gewässern gemein.

Triandria, *Dreymännige.*

Typha.

844. T. latifolia, *Breitblättrige Rohrkolbe.* In Teichen und Seen.
24 July.

845. T. anguſtifolia, *Schmalblättrige*
24 July, *Rohrkolbe.* Hinter der Pillnitzer Ziegelſcheune im Geſümpfe; desgleichen in Moritzb. Teichen mit vorigem in Geſellſchaft; ſparſam.

Sparganium.

846. S. ramoſum, *Aeſtige Igelskno ſpe* oder
24 Juny-- Auguſt. *Igelskopf.* In kleinen Bächen, Waſſergräben, und ſtehenden Gewäſſern.

847. S. ſimplex, *Einfache Igelskno ſpe.*
24 Juny-- Auguſt. Blühet mit vorigem gemein.

848. S. natans, *Schwimmende Igelskno-*
24 July, Auguſt. *ſpe.* Am Fuſsſteige über die Wieſen von Moritzburg nach Radeburg, in den kleinen mit Birken und Erlen umgebenen Lachen; vor und zwiſchen Langebrück und Lauſa in mehrern kleinen Lachen an den einzelnen hohen Kiefern, unweit der Wieſenmauer; auf den Ottendorfer Wieſen in Waſſergräben mit **Utricularia vulgaris.**

Carex.

Spica unica simplici; mit einer einzigen einfachen Aehre.

849. C. pulicaris, (C. Pfyllophora,)

24 May. Juny, *Floh-Segge, Floh-Riedgras.*

Bey Pirna auf der Viehleite am Fufsſteige über die Wieſen nach Rothwernsdorf, bey dem kleinen Damme vor dem ſchmalen Quergraben, auf einer breiten Raſenſtelle zur Linken am moraſtigen Geſträuche, häufig; auf den naſſen Wieſen bey Schönborn und Lomnitz; an dem Zſchornaer Groſsteiche im Raſen.

350. C. cyperoides, *) (C. bohemica,)
24 Juny—Septbr. *Cyper-Segge.* Vor Dippelsdorf an der Straſse, unter der Brücke zur rechten Hand; bey Volkersdorf am ſandigen Ufer des niedern und obern Waldteiches; vor Lauſa an dem am Buſche angränzenden Teiche zur Rechten; in dem abgelaſſenen Zſchornaer Groſsteiche in den Ackerfurchen ſehr häufig; auf den hohen Dämmen des Moritzburger Mittelteiches; wie auch in der Dresdner Heide und in den Waldungen bey Moritzburg und hinter Radeburg bisweilen.

*) Die aus vielen kleinen Aehrchen gleichſam in ein Haupt zuſammen gedrängte Aehre dieſes beſondern Riedgraſes, wächſt mit ihrer langen Hülle, wie der Cyperus flaveſcens, Anfangs aus dem Erdboden ganz halmlos hervor; die ſehr faſerige Wurzel treibt dann mehrere 6 bis 9 Zoll hohe einährige Halme. An einer iſolirten Pflanze zählte ich deren 30, die insgeſamt 1 Fuſs hoch waren.

Spicis androgynis ſeſſilibus alternis; mit auſſitzenden, wechſelsweiſe ſtehenden Zwitter-Aehren.

151. C. arenaria, *Sand-Segge.* Am rechten Ufer des Prieſsnitzbaches ungefähr ½ Stunde weit im Grunde auf einer freyen Stelle häufig; desgleichen auch vorne einige hundert Schritte über die Klippelbrücke den ſandigen Fahrweg in den Wald hinan, der zum ſchwarzen ⊹ führt.

Offic. Caricis arenariae ſ. Sarſaparillae germanicae radix.

24 Juny.

152. C. intermedia, (C. diſticha) (C Spicata,) *Mittlere Segge.* Hinter Conſtappel im Prinzen-Grunde auf naſſen Wieſen; auf der Cottaer Wieſe; auf den Naſſen hinter Zaſchendorf; vor Pirna am Egelſee und anderwärts.

24 May. Juny.

153. C. Schreberi, (C. praecox,) *Schreberſche Segge.* Auf trokkenen Grashügeln allenthaiben.

24 April, May.

854. C. ovalis, (C. leporina,) *Eyförmige Segge.* ♃ May. An Gräben und in Waldungen.

855. C. vulpina, *Fuchs-Segge.* ♃ May, Juny. An Wasfergräben und an Teichen.

856. C. brizoides, *Zittergrasartige Segge.* ♃ May, Juny. In Hainen und Gebüschen; am Priefsnitzbache.

857. C. ftellulata, (C. echinata,) *Sternförmige Segge.* ♃ May. Hinter dem Heller; desgleichen bey Rähnis, Wilschdorf und Moritzburg auf naffen Wiefen.

858. C. muricata, *Zackigte* oder *Stachel-Segge.* ♃ May. Im Plauenschen Grunde an Felfen; auf waldigen und fteinigen Bergen hin und wieder.

859. C. remota, (C. axillaris,) *Entfernte Segge.* ♃ May, Juny. Im Zschoner Grunde hinter der Mühle am Bache; im Gamiger Luftbüschgen am Bache; bey dem Liegauer Bade und sonft im feuchten schattigen Gebüsche hin und wieder.

860. C. elongata, *Verlängerte Segge.* Hinter dem Heller im Erlenbruche; an Moritzburger Teichen; hinter Weifsig auf Sumpfwiefen an der Strafse im Bufche; und in andern fumpfigen Orten.
24 May, Juny.

861. C. Curta, (C. canefcens,) *Kurze Segge.* Am Prieſsnitzbache und ſonſt auf naſſen Wieſen gemein.
24 May, Juny.

862. C. paniculata, *Rifpenförmige Segge.* Bey Potſchappel hinter dem zur Glasfabrique gehörigen Wohnhauſe auf der Wiefe, in einem kleinen mit alten Weiden umgebenen Moorbrnche; bey Pirna auf der Viehleite im Geſümpfe, mit Arund. Phragmites ſehr häufig; im Kaitzer Thale am Teiche, wo der Weg nach Kunnersdorf hinan führt; hinter dem Moritzburger Thiergarten.
24 May, Juny.

Spicis sexu distinctis, masculis solitariis, foemineis sessilibus; mit nach dem Geschlechte abgesonderten Aehren, die männliche allein stehend, die weiblichen aufsitzend.

863. C. flava, *Gelbe Segge*

24 April, May. und

864. C. Oederi, *Oeders Segge.*

24 April, May.

Auf nassen Wiesen beyde in Gesellschaft mit einander gemein. Letztere wird auch von Willdenow und Schkur für eine blosse Abart der erstern erklärt.

865. C. digitata, *Fingerförmige Segge.*

24 April, May. Bey Potschappel jenseits der Weiseritz an Felsen; im Fischhausgrunde auf sandigen Anhöhen; im Niederwarthaer und Costebauder Thale auf buschigen Anhöhen und sonst nicht selten.

866. C. collina, (C. montana,) *Hügel-* oder *Berg-Segge.* Hinter Dohna, am Fufsteige nach Bloschwitz auf der buschigen Anhöhe linker Hand im Laubholze, häufig; auch im Dohnaer Kirchenholze.

24 April. May.

867. C. ciliata, (C. ericetorum,) *Gefranzte Segge.* Blühet mit C. praecox und Juncus campestris gemein.

24 April, May.

868. C. praecox, (C. filiformis,) *Frühe Segge.* Auf den sandigen Anhöhen bey dem Priesnitzbache und in der Dresdner Heide allenthalben.

24 April, May.

869. C. pilulifera, *Pillen-Segge.* In Hainen und Gebüschen hin und wieder; bey Cotta am obern Teiche im Erlenholze.

24 May.

Spicis sexu distinctis, masculis solitariis, foemineis pedunculatis; mit nach dem Geschlechte abgesonderten Aehren, die männliche allein stehend, die weiblichen gestielt.

870. C. pallescens, *Bleiche Segge.* Auf
24 May. Buschwiesen gemein; auf den nassen Wiesen bey Rähnis, Bernsdorf u. s. w.

871. C. panicea, *Schwaden-* oder *Hirse-*
24 May. *Segge.* Fast auf allen nassen Wiesen in grösster Menge.

872. C. Pseudo-Cyperus, *Zyperartige*
24 May. *Segge.* Hinter dem Heller an der Lache im Erlenbruche; bey Pirna auf der Viehleite, am Fusssteige nach Rothwernsdorf im Gesümpfe mit C. paniculata; bey Moritzburg an Teichen und sonst hin und wieder.

873. C. cespitosa, *Rasen-Segge.* Auf nas-
24 May. sen Buschwiesen und in Torfsümpfen gemein.

874. C. distans, *Entlegenährige Segge,*
24 May, Juny. Bey Cotta im feuchten Gebüsche und an der zweyten Remise mit C. recurva.

875. C. clandestina, (C. humilis,)
24 April. May. *Heimliche Segge.* Auf der dürren Anhöhe bey der Radebeuler Sumpfwiese mit Potentilla alba; auf der Bosel am Felsenhange nach der Meissner Strasse hin.

876. C. Drymeja, (C. sylvatica,)
24 May, Juny. *Wald-Segge.* Vor Costebaude auf der buschigen Anhöhe und in den dabey gelegenen kleinen Schluchten; im Gebüsche am Egelsee; bey Dohna und Weesenstein im Laubholze.

Spicis sexu distinctis, masculis pluribus; mit nach dem Geschlechte abgesonderten Aehren, der männlichen mehrere.

877. C. riparia, *Strand- oder Ufer-Segge.*
24 May, Juny. Bey Cotta am obern Teiche; vor der zweyten Remise in Gräben mit C. recurva und sonst in Sümpfen gemein.

878. C. acuta, *Schneidende Segge.* An
24 May, Juny. Wassergräben gemein.

879. C. recurva, (C. flacca,) (C. glauca,)
24 May, Juny. *Graublättrige Segge.* Vor der zweyten Remise an Gräben und am Buschrande mit C. distans; bey Dohna im Bloschwitzer Laubholze; am Fusse des Wilschberges gegen Mitta gundanderwärts.

880. C. vesicaria, (C. inflata,) *Blasen-*
24 May. *Segge.* An Wassergräben, Seen und Teichen allenthalben.

881. C. ampullacea, (C. obtusangula,)
24 May. *Flaschen-Segge.* Blühet mit vorigem in Gesellschaft.

882. C. hirta, *Haarige Segge.* Am Prieß-
24 May. nitzbache und am Elbufer nach Loschwitz; am Grosengarten-Teiche und im sandigen Boden überall gemein.

Tetrandria, *Viermännige.*

Littorella.

883. L. lacustris, *Ufer-Strandling.* Im
24 Juny, July. Jahr 1805 in dem von Zeit zu Zeit abgelassenen Grosteiche bey Zschorna im sandigen Boden, in sehr grosser Menge nebst Illecebrum verticillatum und Corrigiola littoralis.

Urtica.

884. U. urens, *Heidernessel, Kleine*
Offic. Urticae minoris hb, *Brennessel.* An Mauern der
⊙ Juny-- August. Vorstadt u. s. w.

885. U. dioica, *Grosse Brennessel.* In
Offic. Urticae majoris rad. hb. femina. Gärten und an Zäunen und
24 Juny-- August. Hecken.

Betula.

886. B. alba, *Weiſſe Birke.* In Birkenhainen; vorzüglich auf den Anhöhen und der Bergkette auf dem linken Elbufer, zwiſchen Dresden und Meiſſen.

♄ April, May.

887. B. pendula,*) *Hange-Birke.* An Bächen, um Dörfer und in Hainen, mit vorigem.

♄ April, May,

888. B. Alnus, (Alnus glutinoſa,) *Gemeine Erle.* An Bächen, Quellen, und andern naſſen und ſumpfigen Orten.

♄ April, May.

Pentandria, *Fünfmännige.*

Xanthium.

889. X. ſtrumarium, *Spitz-Klette.* In Laubegaſt an der Elbe; in Radebeul und Kötzſchenbroda; aber ſparſam.

Offic. Xanthii ſ. Bardanae minoris ſemina.

⊙ July, Auguſt.

*) Bey WILLD. nur eine Abart von B. alba.

Amaranthus.

890. A. Blitum, *Wilder* oder *Maier-Amaranth.* Im Gartenlande; auch an den Mauern der Vorstädte.
⊙ July, August.

891. A. retroflexus, *Scharfstenglicher Amaranth.* Auf dem neuen Anbau, vorzüglich in der Badegasse zur linken Hand an Häusern, mit Salsola Kali hin und wieder.
⊙ July. August.

Polyandria, *Vielmännige.*

Ceratophyllum.

892. C. demersum, *Spitzfrüchtige Zinken, Rauhes Wasserhorn.* Im grosen Gehäge und auf dem Serkewitzer Elbheger in Lachen.
♃ June, July.

893. C. submersum, *Stumpffrüchtige Zinken, Glattes Wasserhorn.* Hat mit vorigem gleichen Standort.
♃ June, July.

Myriophyllum.

894. M. Spicatum, *Aehrenblüthiges Federkraut, Teichfenchel, Wassergarbe.* Im Bächen, Teichen und Seen.
♃ July, August.

895. M. verticillatum, *Wirtelblütiges Federkraut.* In den Stadtgräben und sonst mit vorigen in Gesellschaft.
♃ July, August.

Sagittaria.

896. S. sagittifolia, *Pfeilkraut.* In Teichen und allen stehenden Gewässern.
♃ June. July.

Poterium.

897. P. Sanguisorba, *Gemeine Becherblume, Kleine Bibernell.* Bey der Schäferey an der Weiseritz; im Plauenschen Grunde, und an verschiedenen Orten.
Offic. Pimpinellae italicae hb.
♃ June, July.

Quercus.

898. Q. Robur, *Stein-Eiche, Winter-Eiche.* Bey Volkersdorf, Hermsdorf, und in der Heide.
Offic. Querci cort. glandes.
♄ May.

899. Q. pedunculata, *Stiel-Eiche, Sommer-Eiche.* Im grofsen Garten u. f. w.
♄ April, May.

Fagus.

900. F. fylvatica, *Gemeine* oder *Rothbuche, Maſtbuche.* Im grofsen Garten, und in den Tharander Waldungen.
♄ May, Juny.

Carpinus.

901. C. Betulus, *Weifsbuche, Hain-* oder *Hagebuche.* In Gebüſchen; im grofsen Garten u. f. w.
♄ May, Juny.

Corylus.

902. C. Avellana, *Haſelſtaude, Haſelnufs.* Im Laubgehölze faſt überall.
♄ März, April.

Monadelphia, *Einbrüdrige.*

Pinus.

903. P. fylveſtris, *Gemeine Fichte, Kiefer.* Dieſer Baum bildet gröſstentheils die Dresdner Heide.
Offic. Pini turiones, resina, Terebinthina communis.
♄ May.

904. P. Larix, *Lerchen-Fichte, Lerchenbaum.* Auf dem Borsberge; bey Moritzburg an der Höllenburg, und anderwärts.

Offic. Terebinthina Veneta.

♄ April, May.

905. P. Strobus, *Weymuths-Fichte.* Wächſt mit vorigem in Geſellſchaft; ingleichen am Windberge.

♄ May.

906. P. Abies, *Tannen-Fichte, Fichte, Rothtanne.* In der Dresdner und Dippoldiswaldaer Heide u. ſ. w.

Offic. Abietis Turiones, reſina, pix Burgundica.

♄ May.

907. P. Picea, *Edel-Fichte, Weiſstanne.* Hat mit vorigem allenthalben gleichen Standort.

♄ May.

Syngeneſia, *Vereinigte.*

Bryonia.

908. B. alba, *Weiſſe Zaunrübe, Gichtrübe.* Vor Kötitz am Ausgange des Buſches, rechter Hand am Weinberge in Sträuchern; an Hecken, Garten- und Weinbergs-Blanken hin und wieder.

Offic. Bryoniae rad.

♃ Juny, July.

Classis XXII.

Dioecia, *Zweyhäusige.*

Diandria, *Zweymännige.*

Salix.

909. S. triandra, *Dreymännige Weide.*

♄ May. Ueber dem Linkschen Bade an der Elbe bey dem Sandhügel, und sonst am Ufer und auf Dämmen der Elbe.

910. S. monandra, (S. Helix,*) *Einmännige- oder Bach-Weide.* An der Weiseritz und vor dem Dohnaer Schlage zur Rechten in den Schanzen.

♄ April, May.

911. S. fragilis,**) *Bruch- oder Knack-Weide.* Auf Triften und Angern um die Dörfer überall.

Offic Salicis fragilis cortex, †)

♄ May.

*) Die Linneische S. purpurea und S. Helix werden von HOPPE ebenfalls als wahre Arten angenommen.

**) S. fragilis L. wird von HOFMANN in S. decipiens und S. bigemmis zerlegt.

†) Cortex Salicis vitellinae leistet eben dieselbe vortrefliche Wirkung, und ist in den hiesigen Apotheken eingeführt; auch die Rinde von S. alba ist sehr gewöhnlich.

912. S. vitellina, *Gold-Weide, Dotter-Weide.* An Bächen und Gräben.
♄ May.

913. S. alba, *Gemeine* oder *Weiſſe Weide.* An der Weiſeritz und um die Dörfer mit S. fragilis gemein.
♄ May.

914. S. aurita, *Salbey-Weide, Kleiner Werft.* Hinter Volkersdorf am obern Waldteiche; auf Moritzburger Wieſen und auf den Naſſen.
♄ May.

915. S. Caprea, *Palm-Weide, Sohl-Weide, Groſser Werft.* Im Laubgehölze im groſsen Garten, Plauenſchen Grunde u. ſ. w.
♄ April.

916. S. viminalis, *Korb-Weide, Fiſcher-Weide.* An der Elbe und Weiſeritz.
♄ May.

917. S. depreſſa, (S. polymorpha,) *Sumpf-Weide.* Zwiſchen Lohmen und Pirna, und bey Weiſsig auf naſſen Wieſen; ingleichen auch um Groſsröhrsdorf an der Röder auf feuchten Wieſen.
♄ May.

918. S. arenaria, *Sand-Weide*, *Kleine Silber-Weide.* Auf sumpfigen Wiesen zwischen Grosnaundorf und Oberlichtenau; desgleichen auch bey Moritzburg mit S. aurita und S. depressa.
♄ May.

Tetrandria, *Viermännige.*

Viscum.

919. V. album. *Weisser Mistel.* Im grossen Garten auf hohen Linden; in der Heide hin und wieder.
Offic. Visci lignum s. Visci querni stipites.
♄ März, April.

Pentandria, *Fünfmännige.*

Cannabis.

920. C. Sativa, *Gemeiner Hanf.* Auf altem Gemäuer und Aeckern nicht selten.
Offic. Cannabis semina.
☉ May, Juny.

Humulus.

921. H. lupulus, *Gemeiner Hopfen.* Im Gesträuche und an Hecken und Zäunen.
Offic. Lupuli coni s. Strobuli.
♃ Juny, July.

Octandria, *Achtmännige.*

Populus.

922. P. alba, *Weiſſe Pappel.* Im groſsen Garten, in Prinz Antons Garten u. ſ. w.
♄ März, April.

923. P. nivea, *Silber-Pappel.* Mit vorigem, und wird ohne Anpflanzung hin und wieder wild gefunden.
♄ April.

924. P. tremula, *Zitter-Pappel, Eſpe.* Im groſsen Garten, kleinen Gehäge u. ſ. w.
♄ März, April.

925. P. nigra, *Schwarze Pappel.* Im groſsen Garten; in Friedrichſtadt an der Weiſeritz, und im Laubgehölze hin und wieder.
Offic. Populi gemmae.
♄ März, April.

926. P. nigra italica, (dilatata,) *Italieniſche Pappel.* Im kleinen Gehäge; vor dem weiſſen und ſchwarzen Thore u. ſ. w.
♄ April.

Enneandria, *Neunmännige.*

Mercurialis.

927. M. perennis, *Dauerndes Bingelkraut.*

24 April, May. Im Plauenschen- und Zschoner Grunde; wie auch im Pillnitzer Friedrichsthale in schattigen Gebüschen.

928. M. annua, *Jähriges Bingelkraut.* In den Weinbergen bey Mücken; an den Mauern der Vorstadt, und auf altem Gemäuer hin und wieder.

Offic. Mercurialis hb.

⊙ Juny—August.

Hydrocharis.

929. H. Morsus ranae, *Kleine Seeblume, Froschbiss.* In den Moritzburger Schlosteichen; vor Radebeul, und vor Zaschendorf hinter Sörnewitz, in Wassergräben; im grosen Gehäge am Fussteige nach Uebigau zur rechten Hand in der kleinen Lache.

24 July, August.

Monadelphia, *Einbrüdrige.*

Juniperus.

930. J. communis, *Gemeiner Wachholder.* Im Seyfersdorfer Thale; um die Pillnitzer Ruine, und auf dem Porsch- Keulen- und Wilschberge.

Offic. Juniperi lignum, baccae, Sandaraca resina.

♄ April, May.

Classis XXIII.

Polygamia, *Vielehige.*

Monoecia, *Einhäusige.*

Andropogon.

931. A. Ischaemum, *Deutsches Bartgras.* Am Eingange in den Plauenschen Grund jenseits der Weiseritz auf der freyen Anhöhe bey dem Wasserrechen; vor dem Schlosse Pillnitz wo die fliegende Fähre anlandet, auf dem dürren freyen Platze; desgleichen an den Pillnitzer Ruinen, und zwischen Pillnitz und Oberboyritz an den Weinbergsmauern; wie auch hinter Gävernitz, am Fussteige nach Naustadt, auf der Anhöhe; am Wege von Zscheila nach Meissen auf den Anhöhen zur rechten Hand.

24. July, August.

Holcus.

932. H. mollis, *Weiches Honiggras, Roſs-gras.* Zwiſchen Mühlbach und Schloizig im Grunde auf Anhöhen; ingleichen hinter Weiſsig auf der erſten buſchigen Anhöhe; bey Dippoldiswalde, Tharand und Bärenſtein auf Anhöhen; ſelten und ſparſam.
24 Juny, July.

933. H. lanatus, *Wolliges Honiggras.* Auf allen Wieſen gemein.
24 May, Juny.

Valantia.

934. V. cruciata, *Kreuzförmige Valantie, Gülden-Kreuzkraut.* Im Zſchoner- und Conſtappler Thale an Bächen und am ſchattigen Gebüſche.
24 May, Juny.

Parietaria.

935. P. officinalis, *Gewöhnliches Glaskraut.* Ueber der Loſchwitzer Kirche in dem ungefähr 500 Schritte davon entfernten ſchmalen Weinbergsgäſschen, im Geſträuche und an den Weinbergsblanken zur Linken, in Menge.
Offic. Parietariae hba.
24 July, Auguſt.

Atriplex.

936. A. haſtata, *Spieſsblättrige Melde.*
⊙ July, August. Vor dem Dohnaer Schlage auf dem Miſtanger mit Chenopodio glauco et viridi; in Laubegaſt an der Elbe; ſehr ſelten und ſparſam.

937. A. patula, *Ausgebreitete Melde.* An
⊙ July. Hecken und Zäunen gemein.

Acer.

938. A. Pſeudo-platanus, *Weiſſer Ahorn, Urle.* Im Laubgehölze
♄ May. im groſsen Garten, und an andern Orten.

939. A. platanoides, *Spitzer Ahorn, Lenne.* Hat mit vorigem einerley
♄ April, May. Standort.

940. A. campeſtre, *Feld-Ahorn, Masholder.* An verſchiedenen Orten im
♄ May. Laubgehölze, mit vorigen beyden gemein.

Dioecia, *Zweyhäufige*

Fraxinus.

941. F. excelsior, *Hohe* oder *Gemeine Esche.* Im grofsen Garten, Plauenschen Grunde und in Laubwäldern hin und wieder.

Offic. Fraxini lignum, cort. folia, semina, (Lingua avis)

♄ April. May.

Schlufs-Anmerkungen.

1.) Für die Nichtbesitzer des Willdenowischen Werks mufs noch bemerkt werden, dafs nachbenannte in vorliegendem Verzeichnisse als Species angegebenen Sexualisten, nämlich:

Circaea intermedia als Abart von *C. alpina*,
Cuscuta Epithymum - - - *C. europaea*,
Euphorbia degener - - - *E. Cyparissias*,
Thlaspi praecox - - - *T. montanum*,
Orobus tenuifolius - - - *O. tuberosus*

dort vorkommen. Auch sind bey Willdenow Tilia grandifolia und T. parvifolia zusammen unter dem Linneischen Namen T. europaea aufgeführt, die aber von Mil-

LER, DU HAMEL u. a. mit Recht als eigene Arten von einander getrennt werden. Gern würde ich der von WILLDENOW beobachteten Anordnung der Sexualpflanzen überhaupt gefolgt seyn, wenn sein vortreffliches Werk nur schon vollständig herausgekommen wäre. Indessen wird für diejenigen, welche sich die Abweichungen an den gehörigen Stellen bemerken wollen, durch den bey dem Drucke gegenwärtiger Schrift an den Seiten sowohl, als an dem untern Rande gelassenen Raum, weshalb ich auch Schreibepapier gewählt habe, hoffentlich zur Gnüge gesorgt seyn.

2.) Die S. 29. No. 36. aufgeführte Plantago psyllium ist eigentlich P. arenaria Waldstein: Da selbige in den in der Vorerinnerung benannten botanischen Werken nicht zu finden ist, will ich deren Beschreibung hier beyfügen:

herbacea, pilosa-cana, caule erecto ramoso, foliis subintegerrimis, capitulis foliatis.

3.) S. 129. No. 548. Nach Ajuga pyramidalis setze man Pollich Pal. No. 542. Von SCHREBER, CRANTZ, GERARD und HALLER wird A. genevensis nicht als eine eigne Spezies aufgeführt, sondern mit der A. pyramidali als blose Abart zusammen genommen. Auch KROCKER, WILLDENOW u. a. m. bemerken, dafs sie vielleicht eine Varietät davon seyn könne.

Index Generum.

Acer - S. 234
Achillea - 192
Acorus - - 76
Actaea - 119
Adonis - - 126
Adoxa - - 88
Aegopodium - 66
Aethusa - - 62
Agrimonia - 104
Agrostemma - 101
Agrostis - - 16
Aira - - 17
Ajuga - - 129
Alchemilla - 33
Alisma - - 81
Allium - - 72
Alopecurus - 14
Alsine - - 68
Alyssum - 145
Amaranthus - 222
Anagallis - 40
Anchusa - - 40
Andropogon - 232
Androsace - 43
Anemone - 123
Angelica - - 62
Anthemis - 192
Anthericum - 74
Anthoxanthum - 7
Anthyllis - 158
Antirrhinum - 140
Apargia - 171
Aquilegia - 121
Arabis - - 148
Arctium - 180
Aristolochia - 205
Arenaria - 96
Arnica - - 186
Artemisia - 182
Arum - - 206
Arundo - 23
Asarum - - 103
Asclepias - 51
Asparagus - 75
Asperula - - 32
Aster - - 190

Aſtragalus - S. 162
Aſtrantia - - 58
Athamanta - 59
Atriplex - 234
Atropa - - 46
Avena - 23

Ballota - 133
Bellis - - 185
Berberis - 71
Betonica - 130
Betula - - - 221
Bidens - 182
Biſcutella - 143
Borrago - - 39
Braſſica - 149
Briza - - 19
Bromus - 22
Bryonia - - 225
Butomus - 90

Calla - - 206
Callitriche - 11
Caltha - - 122
Campanula - 46
Cannabis - - 228
Cardamine - 149
Carduus - - 177
Carpinus - 224
Carex - - 210
Carlina - 177
Carum - - 66
Caucalis - 58
Centaurea - 193
Centunculus - 28
Ceraſtium - 100
Ceratophyllum 222
Cerinthe - 37
Chaerophyllum 64
Chara - - - 207
Cheiranthus - 148
Chelidonium - 119
Chenopodium - 53
Chondrilla - 173
Chryſanthemum 186
Chryſoſplenium 93
Cichorium - 170
Cicuta - - - 65
Circaea - - 2
Ciſtus - - 119
Clematis - 121
Clinopodium - 135
Cnicus - - 178
Cochlearia - 145
Colchicum - 79
Comarum - 117
Conium - - 59
Convallaria - 73
Convolvulus - 43
Conyza - - 184
Cornus - - - 33
Coreopſis - 194
Coronilla - 165
Corrigiola - 68
Corylus - - 224
Crataegus - 109

Crepis - S. 173
Cucubalus - 97
Cuſcuta - - 34
Cynogloſſum - 39
Cynoſurus - 21
Cyperus - - 10
Cypripedium - 205
Cytiſus - 167

Dactylis - 17
Daphne - - 86
Datura - - 43
Daucus - 58
Delphinium - 120
Dianthus - 95
Digitalis - - 139
Dipſacus - 27
Draba - - 143
Droſera - 69

Echinops - 195
Echium - - 37
Elatine - 88
Elymus - - 25
Epilobium - 33
Erica - - 85
Erigeron - 188
Eriophorum - 13
Ervum - - 166
Eryngium - 56
Eryſimum - 147
Evonymus - 49
Eupatorium - 181

Euphorbia - 105
Euphraſia - 137

Fagus - - 224
Feſtuca - 21
Filago - - 194
Fragraria - 114
Fraxinus - - 235
Fumaria - 156

Galanthus - 71
Galeopſis - - 131
Galium - - 30
Geniſta - 157
Gentiana - 51
Geranium - 153
Geum - - 116
Gladiolus - 9
Glecoma - 128
Gnaphalium - 184
Gratiola - - 5
Gypſophila - 94

Hedera - 50
Hedyſarum - 165
Helleborus - 127
Heracleum - 58
Herniaria - 55
Hieracium - 175
Holcus - - 233
Holoſteum - 26
Hordeum - - 25
Hottonia - 42

Humulus . S. 228
Hydrocharis . 230
Hydrocotyle . 57
Hyoſciamus . 43
Hyoſeris . . 177
Hypericum . 168
Hypochoeris . 170

Jaſione . . 195
Iberis . . 144
Illecebrum . 50
Impatiens . 196
Imperatoria . 66
Inula . . 187
Iris . . 9
Iſatis . . 143
Juncus . . 76
Juniperus . 194

Lactuca . 174
Lamium . . 130
Lapſana . 177
Laſerpitium . 59
Lathraea . 136
Lathyrus . 159
Ledum . . 91
Lemna . . 208
Leontodon . 171
Leonurus . . 128
Lepidium . 146
Leucojum . 71
Liguſtrum . 2
Lilium . . 75
Limoſella . 140
Linum . . . 68
Lithospermum . 38
Littorella . 220
Lolium . . 24
Lonicera . 48
Lotus . . 167
Lunaria . . 144
Lychnis . . 101
Lycopus . . 6
Lycopſis . 39
Lyſimachia . 41
Lythrum . 103

Malva . 155
Marrubium . 133
Matricaria . 185
Medicago . . 166
Melampyrum . 137
Melica . . 18
Melittis . 134
Mentha . . 128
Menyanthes . 42
Mercurialis . 230
Meſpilus . 110
Milium . . 16
Monotropa . 91
Montia . . 26
Myagrum . 144
Myoſotis . . 40
Myoſurus . 70
Myriophyllum . 223

Narcissus - S. 72
Nardus - - 14
Nepeta - 133
Nigella - - 121
Nymphaea - 120

Oenanthe - 61
Oenothera - 85
Ononis - - 158
Onopordum - 181
Ophrys - - 202
Orchis - - 197
Origanum - 135
Ornithogalum - 74
Ornithopus - 165
Orobanche - 136
Orobus - 158
Oxalis - - 102

Panicum - 15
Papaver - - 118
Parietaria - 233
Paris - - 89
Parnassia - 68
Pastinaca - - 66
Pedicularis - 142
Peplis - - 78
Peucedanum - 60
Phalaris - - 14
Phellandrium - 65
Philadelphus - 108
Phleum - - 16
Physalis - 38
Phyteuma - - 46
Pimpinella - 66
Pinguicula - 5
Pinus - - 224
Plantago - - 29
Poa - - 19
Polycnemum - 9
Polygala - - 157
Polygonum - 86
Populus - - 229
Potamogeton - 34
Potentilla - - 114
Poterium - 223
Prenanthes - 174
Primula - - 42
Prunella - 135
Prunus - - 108
Pulmonaria - 37
Pyrola - - 91
Pyrus - 110

Quercus - 223

Ranunculus - 124
Raphanus - 147
Reseda - - 105
Rhamnus - 49
Rhinanthus - 137
Ribes - - 49
Rosa - - - 112
Rubus - - 113
Rumex - 79

Sagina - - 35
Sagittaria - 223
Salix - - 226
Salfola - - 56
Salvia - - 6
Sambucus - 67
Sanguisorba - 29
Sanicula - - 57
Saponaria - 94
Satyrium - - 201
Saxifraga - 94
Scabiofa - - 27
Scandix - 63
Sherardia - - 32
Schoenus - 10
Scirpus - - - 11
Scleranthus - 93
Scorzonera - 172
Scrophularia - 138
Scutellaria - 134
Sedum - - 99
Selinum - 61
Sempervivum - 107
Senecio - - 189
Serapias - 204
Sefratula - 181
Sefeli - - - 65
Silene - - 99
Sinapis - - 150
Sifymbrium - 150
Sium - - 60
Solanum - - 45
Solidago - 189
Sonchus - - 172
Sorbus - - 109
Sparganium - 209
Spartium - 157
Spergula - - 100
Spiraea - 111
Stachys - - 132
Statice - - 70
Stellaria - 97
Symphitum - 39
Syringa - - 2

Tanacetum - 183
Teucrium - 129
Thalictrum - 122
Thefium - 37
Thlafpi - - 145
Thymus - 134
Tilia - - 119
Tordylium - 58
Tormentilla - 113
Tragopogon - 171
Trapa - - 33
Trientalis - - 82
Trifolium - 163
Triglochin - 79
Triticum - - 25
Trollius - 127
Tulipa - - 76
Turritis - 149
Tuffilago - - 191
Typha - - 208

Ulmus . S. 56
Urtica . . 220
Utricularia . 6

Vaccinium . 85
Valantia . 233
Valeriana . 8
Verbascum . 44
Verbena . 6
Veronica . . 3
Viburnum . 67
Vicia . . 160
Vinca . . . 45
Viola . . . 195
Viscum . . 228

Xanthium . 221

Regiſter der Ortſchaften,

wo die in dem Nomenklator enthaltenen ſeltenern Pflanzen anzutreffen.

Altenberg No. 51. 140. 218. 325. 365. 387. 451
589. 575. 579. 712 745. 797. 827. 828
Brockwitz 49. 58. 132. 186. 266. 274. 380
840
Conſtappel (Grund bey) 214. 399. 478. 587.
665. 694. 777. 785. 788. 793
— — (Prinzengrund) 40. 358. 665. 777
852
Coſtebaude 6. 29. 178. 183. 196. 197. 214
215. 224. 251. 274. 279. 304. 379. 405
496. 505. 556. 567. 829. 876
Cotta 127. 183. 254. 273. 328. 344. 357. 358
360. 424. 530. 577, 625. 852
Dohna 29. 32. 172. 183. 251. 252. 559. 665
718. 819. 820. 832. 834. 866. 876. 879
Dresden, (Stadt) 59. 98. 243. 347. 419. 556
582. 599. 620. 631. 645. 788. 799. 908
Dresdner nächſte Umgebungen 24. 27. 49 76
90. 91. 103. 115. 118. 136. 141. 150. 163
165. 168. 193. 201. 217. 231. 246. 295
307. 312. 323. 327. 357. 362. 380. 393

398. 480. 500. 577. 578. 582. 583. 584
591. 592. 600. 602. 604. 614. 616. 619
623. 659. 674. 686. 691. 692. 694. 717
721. 725. 738. 743. 763. 775. 799. 802
817. 820. 829. 835. 840. 874. 879. 891
897. 919. 929. 936
Dresdner Heide 75. 77. 78. 205. 211. 318
342. 355. 381. 382. 386. 387. 391. 497
650. 713. 837. 850. 851
Geiſing 140. 232. 314. 325. 383. 387. 489
531. 575. 745. 797. 816
Gieſshübel - 29. 207. 211. 503. 620. 797
Gottleube 51. 207. 360. 365. 529. 531. 577
620. 797
Gröbern; (mit den Wieſen oder ſogenannten
Naſſen) 29. 32. 36. 38. 40. 44. 107. 147
172. 215. 231. 259. 261. 264. 266. 273
304. 344. 399. 438. 504. 517. 524. 566
583. 643. 674. 743. 747. 776. 777. 831
838
Groſscotta - 32. 383. 399. 416. 786
Groſsnaundorf - 268. 538. 587. 917. 918
Hohnſtein - - 8. 205. 355. 593
Kaitz 252. 279. 291. 355. 357. 731. 744.
817. 830
Klein Luga - - - 742
Klein Sedlitz - 128. 559. 785
Kötzſchenbroda 171. 236. 289. 413. 445. 591
796. 889
Kreyſcha 38. 148. 205. 369 524. 673. 747
760. 777. 826. 829. 832, 879. 889
Langebrück - 23. 122. 191. 314. 713. 848
Lauſa - 45. 191. 487. 826. 848. 850

Lauenstein - - 489. 745. 797
Liegau - 7. 231. 293. 383. 551. 661. 786
Loschwitz 57. 148. 304. 311. 381. 385. 386
405. 411. 453. 566. 616. 640. 664. 668
706. 783. 814. 832. 935
Luga 141. 271. 455. 514. 819. 823. 824. 836
Maxen, s. Weesenstein.
Moritzburg 13. 41. 42. 44. 114. 152. 186. 191
258. 295. 337. 378. 409. 447. 465. 487
497. 501. 517. 650. 783. 817. 839. 845
848. 850. 862. 872. 904. 905. 929
Niederau 32. 36. 38. 147. 231. 261. 273. 344
358. 424. 504. 508. 530. 583. 777. 807
838
Niederwartha 7. 67. 128. 196. 197. 202. 274
279. 383. 405. 455. 463. 496. 505. 532
551. 559. 567. 572. 575. 785. 829
Oberwartha - - - 702
Ottendorf - - 24. 843
Pillnitz mit der umliegenden Gegend 7. 13. 31
42. 76. 118. 149. 186. 187. 196. 197. 258
282. 283. 298. 304. 345. 348. 384. 385
480. 501. 512. 551. 567. 643. 717. 718
719. 720. 786. 814. 845. 889. 904. 905
931
Pirnaische Gegend 114. 159. 161. 162. 183
318. 399. 411. 501. 508. 517. 554. 629
683. 776. 777. 817. 819. 838. 849. 852
862. 872
Plauen mit dem Grunde 6. 7. 32. 67. 69. 73
79. 95. 96. 107. 119. 122. 141. 145. 168
187. 206. 216. 217. 223. 274. 280. 293
305. 306. 308. 311. 319. 326. 351. 377

379. 383. 393. 401. 402. 406. 407. 453
460. 463. 469. 471. 478. 482. 483. 489
496. 497. 509 514. 530. 547. 550. 553
555. 567. 580. 587. 593. 618. 620. 637
643. 644. 662. 664. 673. 682. 692. 694
702. 703. 731. 744. 752. 760. 771. 783
787. 793. 828. 836. 862. 897. 931
Poste - - 6. 128. 629. 665
Priesnitz mit Zschonergrund 27. 125. 196
214. 251. 279. 280. 377. 379. 399. 547
550. 567. 637. 666. 679. 694. 732. 777
814
Radebeul 45. 76. 170. 485. 512. 875. 889. 929
Rathen - - 293. 539. 830
Rheinhardsgrimma 205. 271. 369. 455. 577
616. 819. 823. 824. 829. 832
Serkewitz 42. 258. 342. 351. 380. 480. 554. 581
Seyfersdorf 159. 191. 202. 304. 391. 465. 503
509. 579. 694. 760. 774. 793
Sörnewitz 57. 169. 171. 201. 259. 282. 311
318. 319. 355. 505. 512. 555. 566. 572
606. 629. 717. 771. 793. 875
Tharand - - 32. 760. 832. 932
Uebigau 27. 103. 152. 380. 504. 556. 584
796. 807
Volkersdorf 41. 45. 159. 224. 438. 487. 500
763. 850
Wachwitz - 115. 170. 290. 383. 512
Weesenstein mit dem Maxner Grunde 32. 145
503. 509. 567. 580. 593. 820. 828. 830
836. 876. 932
Wehlen (Städtlein) - - 36. 665
Weinböhla - 32. 178. 197. 358. 412. 421

Weisig 51. 122. 132. 148. 170. 233. 383
384. 650. 662. 668. 823. 824. 932
Wildberg - - 379. 514. 665
Zaschendorf 29. 159. 273. 282. 727. 840. 852
929
Zinnwald - - 286. 365. 827
Zschorna 45. 49. 186. 216. 224. 268. 283
295. 487. 517. 839. 849. 850. 883

Verbeſſerungen.

Bey den deutſchen Trivielnamen vor No. 9. 223. 308. 345. 396. 467. iſt nach dem erſten Trennungszeichen (-) das Wort; *oder* einzuſchieben.

S. 32 No. 149. ſtatt *Matriſylvae* l. *Matriſylvae.*

" 34 " 156. " *Cuſcatae* l. *Cuſcutae.*

" 85 " 365. " V. Oxycoccos, *Moosbeere*, l. V. uliginoſum, *Trunkelbeere, Sumpf-Heidelbeere.*

" 86 " 367 " V. uliginoſum, l. V. Oxycoccos, beide No. 365 und 367 ſind mit einander verwechſelt worden.

" 92 " 385 " *Hedte* l. *Heide.*

" 99 " 417 " *majores* l. *majoris.*

" 153 unten in der Anmerkung; nach Staubfäden füge hinzu; *und eine gewundene haarige Granne*

" 154 No. 640. ſtatt *Suanguineum* l. *Sanguineum.*

" 182 in der Anmerkung ſtatt *Unteraren* l. *Unterarten.*

" 190 No. 785. ſtatt *Halu* l. *Hain.*

" 195. in der Anmerkung: *nach der Ordnung*, l. *der gewöhnlichen Ordnung.*

" 236 ſtatt 36 l. 136. und ſtatt 548 l. 540

New York Botanical Garden Library
QK314 .B83 gen
Bucher, Christian T/Florae Dresdensis no
3 5185 00120 8253